

食薬セ研第10-1645号

2000年12月 1日

4,4'-イソプロピリデンビス
(2,6-ジブロモフェノール)
の細菌を用いる
復帰突然変異試験

厚生省生活衛生局 委託

財団法人食品薬品安全センター

秦野研究所

【目 次】

	頁
要 約	1
緒 言	2
材料 および 方法	3
結果 および 考察	7
文 献	9
Tables	1 ~ 3

【要 約】

4,4'-イソプロピリデンビス(2,6-ジブロモフェノール)の変異原性の有無を、細菌を用いる復帰突然変異試験により検討し、陰性の結果を得た。

検定菌として、*Salmonella typhimurium* TA100、TA1535、TA98、TA1537 および *Escherichia coli* WP2 *uvrA* の5菌株を用い、S9 mix 無添加および添加の条件でプレインキュベーション法により用量設定試験および2回の本試験を行った。用量設定試験を 50.0～5000 $\mu\text{g}/\text{プレート}$ の用量で行ったところ、TA100、TA1535、TA1537 の S9 mix 無添加試験と TA1537 の S9 mix 添加試験では抗菌性を示す用量が認められた。この結果に基づいて、本試験では最高用量を S9 mix 無添加試験では、TA1537 は 156 $\mu\text{g}/\text{プレート}$ 、TA1535 は 625 $\mu\text{g}/\text{プレート}$ 、TA100 は 2500 $\mu\text{g}/\text{プレート}$ 、TA98 および WP2 *uvrA* は 5000 $\mu\text{g}/\text{プレート}$ とし、S9 mix 添加試験では、TA1537 は 625 $\mu\text{g}/\text{プレート}$ 、その他の検定菌は 5000 $\mu\text{g}/\text{プレート}$ とし、公比2で6用量を設定して実施した。ただし、TA1537 の S9 mix 添加試験では、本試験Ⅰで抗菌性のない用量が4用量に満たなかったため、最高用量を 313 $\mu\text{g}/\text{プレート}$ に下げて本試験Ⅰの再試験および本試験Ⅱを行った。

その結果、用いた5種類の検定菌のいずれの用量においても、陰性対照値の2倍以上となる変異コロニー数の増加は認められなかったことから、4,4'-イソプロピリデンビス(2,6-ジブロモフェノール)は、用いた試験系において変異原性を有しないもの(陰性)と判定した。

【緒 言】

既存化学物質安全性点検に係る毒性調査事業の一環として、4,4'-イソプロピリデンビス(2,6-ジブロモフェノール)について、細菌を用いる復帰突然変異試験をプレインキュベーション法¹⁾により実施した。

この試験は、サルモネラ菌 (*Salmonella typhimurium*) におけるヒスチジン要求性から非要求性への復帰突然変異²⁾、ならびに大腸菌 (*Escherichia coli*) におけるトリプトファン要求性から非要求性への復帰突然変異³⁾を指標とした変異原性の検出系である。

試験は、被験物質をそのまま検定菌に作用させる S9 mix 無添加試験と、哺乳動物のもつ薬物代謝酵素によって產生される被験物質の代謝物の変異原性を試験する S9 mix 添加試験とからなっている。

この試験は、「新規化学物質等に係る試験の方法について」（昭和62年3月31日、環保業第237号、薬発第306号、62基局第303号、一部改正平成9年10月31日、環保安第287号、衛生第127号、平成09・10・31基局第2号）および「OECD 毒性試験ガイドライン：471」に準拠し、「化学物質 GLP基準」（昭和59年3月31日、環保業第39号、薬発第229号、59基局第85号、改訂昭和63年11月18日、環企研第233号、衛生第38号、63基局第823号）に基づいて実施した。

【材料および方法】

1. 被験物質

4,4'-イソプロピリデンビス(2,6-ジブロモフェノール) (CAS No. 79-94-7) は、分子式 $C_{15}H_{12}Br_4O_2$ 、分子量 543.88 の白色粉末である。構造式等は Appendix 1 に示した。用いた被験物質は、ロット番号 純度 99.5% であり、

から供与された。被験物質は、使用時まで室温で保管した。本ロットについては、実験期間中安定であることが確認された。

本被験物質は、ジメチルスルホキシド (DMSO、ロット番号 : ACQ2095 および ACL5008、和光純薬工業㈱) に溶解して最高濃度の調製液を調製した後、同溶媒で順次希釈して速やかに試験に用いた。

50 mg/mL 溶液の調製時に、発熱、発泡、変色等の変化は認められなかったことから、被験物質は溶媒中で安定であることが確認された。

2. 陽性対照物質

用いた陽性対照物質および調製法は以下のとおりである。

各検定菌ごとに用いた陽性対照物質は、当研究所で十分な蓄積データが得られている物質および用量とし、それぞれ Table 中に示した。

2-(2-フリル)-3-(5-ニトロ-2-フリル) アクリルアミド

(AF2、和光純薬工業㈱ ロット番号 WTQ0059、純度98%以上)

アジ化ナトリウム (SA、和光純薬工業㈱ ロット番号 DLL3931、純度98%以上)

9-アミノアクリジン (9AA、Sigma Chem. Co. ロット番号 106F06681、純度97%以上)

2-アミノアントラセン (2AA、和光純薬工業㈱ ロット番号 DLH6052、純度90%以上)

AF2、9AA および 2AA は DMSO に、SA は超純水に溶解し、所定の濃度に調製したものをお-20°C で凍結保存し、解凍後速やかに試験に用いた。

3. 検定菌

試験には、*S. typhimurium* TA100、TA1535、TA98、TA1537 および *E. coli* WP2 *uvrA* を用いた。

S. typhimurium の 4 菌株は1997年 8月 7 日に、*E. coli* WP2 *uvrA* 株は1997年 4月 9 日に日本バイオアッセイ研究センターの
から分与された。

検定菌は -80°C で凍結保存したものを用いた。各菌株の凍結保存菌の調製時に、アミノ酸要求性、UV感受性、膜変異 (*rfa*) およびアンピシリン耐性因子 pKM 101 (プラスミド) の有無について調べ、特性が維持されていることを確認した。

試験に際して、ニュートリエントプロス No.2 (Oxoid Ltd.) を入れた L 字型試験管に解凍した菌液を一定量加え、37°C で 10 時間往復振とう培養したものを検定菌液とした。分光光度計により 660 nm の吸光度を測定し、検定菌液の増殖を確認した。試験に用いた検定菌液の、段階希釈法により求めた生菌数を Appendix 2 に示した。

4. 試験材料

1) 合成培地

培地は、極東製薬工業(株)製の最少グルコース寒天培地 (ロット番号 : HY3902、1998年 9月 17日製造) を用いた。なお、培地 1 Lあたりの組成は下記のとおりである。

硫酸マグネシウム・7水和物	0.2 g
クエン酸・1水和物	2 g
リン酸水素二カリウム	10 g
リン酸一アンモニウム	1.92 g
水酸化ナトリウム	0.66 g
グルコース	20 g
大洋寒天 (清水食品)	15 g

径 90 mm のシャーレ 1 枚あたり 30 mL を流して固めたものである。

2) トップアガー

下記の水溶液 (A) および (B) または (C) を容量比 10:1 の割合で混合した。

(A) バクトアガー (Difco Lab.)	0.6 %
塩化ナトリウム	0.5 %
(B) <i>Salmonella typhimurium</i> 用	
L-ヒスチジン	0.5 mM

D-ビオチン	0.5 mM
(C) <i>Escherichia coli</i> 用	
L-トリプトファン	0.5 mM

3) S9 mix

S9 mix 1 mLあたりの組成は下記のとおりである。

S9*	0.1 mL
塩化マグネシウム	8 μmol
塩化カリウム	33 μmol
グルコース-6-リン酸	5 μmol
NADH	4 μmol
NADPH	4 μmol
ナトリウム-リン酸緩衝液 (pH 7.4)	100 μmol

* : 7週齢の Sprague-Dawley 系雄ラットをフェノバルビタール(PB)および 5, 6-ベンゾフラボン(BF)の併用投与で酵素誘導して作製した S9 (キッコーマン株、ロット番号 : RAA-389、1998年8月21日製造) を購入し、-80°Cで凍結保存し、用時に解凍して用いた。

5. 試験操作

プレインキュベーション法により、S9 mix 無添加試験および S9 mix 添加試験を行った。

小試験管中に、被験物質調製液 0.1 mL、リン酸緩衝液 0.5 mL (S9 mix 添加試験においては S9 mix 0.5 mL)、検定菌液 0.1 mL を混合し、37°Cで20分間プレインキュベーションしたのち、トップアガーパートを加えて混和し、合成培地平板上に流して固めた。また、対照群として被験物質調製液の代わりに使用溶媒（陰性対照）または陽性対照物質溶液を用いた。各検定菌ごとの陽性対照物質の名称および用量は各 Table 中に示した。同時に実施した試験については、陰性および陽性対照群を共通とした。

培養は37°Cで48時間行い、発生した変異コロニー数をコロニーアナライザーまたは目視によって算定した。被験物質に由来する沈殿の有無は、肉眼により確認した。また、抗菌

性の有無については、肉眼的あるいは実体顕微鏡下で、寒天表面の菌膜の状態から判断した。用いた平板は用量設定試験においては、陰性および陽性対照群では3枚ずつ、各用量については1枚ずつとした。また、本試験においては、両対照群および各用量につき、3枚ずつを用い、それぞれその平均値と標準偏差を求めた。

最高用量の被験物質 0.1 mL および S9 mix 0.5 mL を、それぞれ最少グルコース寒天培地上に滴下して、培養終了時に雑菌の混入の有無を調べた。

用量設定試験は1回、本試験は同一用量について2回実施し、結果の再現性の確認を行った。

6. 判定

用いた5種の検定菌のうち、1種以上の検定菌の S9 mix 無添加試験あるいは S9 mix 添加試験において、被験物質を含有する平板上における変異コロニー数の平均値が、陰性対照値の2倍以上に増加し、その増加に再現性および用量依存性が認められた場合に、当該被験物質は本試験系において変異原性を有する（陽性）と判定することとした。

【結果および考察】

1. 用量設定試験

「新規化学物質等に係る試験の方法について」および「OECD毒性試験ガイドライン：471」の記載に準拠し、50.0～5000 μg /プレートの範囲で公比を約3として、試験を実施した（Table 1）。その結果、S9 mix 無添加試験においては、TA1537 では 150 μg /プレート以上、TA1535 では 500 μg /プレート以上、TA100 では 1500 μg /プレート以上の用量で抗菌性が認められた。S9 mix 添加試験においては、TA1537 で 500 μg /プレート以上の用量で抗菌性が認められた。また、被験物質に由来する沈殿は、S9 mix 無添加試験では 500 μg /プレート以上、S9 mix 添加試験では 1500 μg /プレート以上の用量で認められた。

以上の結果から、本試験における最高用量は、S9 mix 無添加試験では、TA1537 は 156 μg /プレート、TA1535 は 625 μg /プレート、TA100 は 2500 μg /プレート、TA98 および WP2 *uvrA* は 5000 μg /プレートとした。また、S9 mix 添加試験では、TA1537 は 625 μg /プレート、その他の検定菌は 5000 μg /プレートとした。

2. 本試験

上記の最高用量に基づいて、公比を2として6用量を設定して2回の本試験（本試験Ⅰおよび本試験Ⅱ）を実施した（Table 2、3）。ただし、TA1537 の S9 mix 添加試験では、本試験Ⅰで抗菌性のない用量が4用量に満たなかったため、最高用量を 313 μg /プレートに下げて本試験Ⅰの再試験および本試験Ⅱを行った（Table 2-3）。

その結果、すべての検定菌において、2回の試験とも陰性対照値の2倍以上となる変異コロニー数の増加は認められなかった。

すべての試験において、用いた最高用量の調製液および S9 mix への雑菌の混入は認められなかった。また、陽性対照試験では、いずれの検定菌においても陽性対照物質の変異原性が検出され、陰性対照値とともに計測された変異コロニー数は背景データ（Appendix 3）の変動範囲内（平均値±3×標準偏差）であったことから、本試験系の有効性が確認された。

4,4'-イソプロピリデンビス(2,6-ジブロモフェノール)は、当研究所で本試験と並行して実施した、チャイニーズ・ハムスター培養細胞を用いる染色体異常試験では陰性であった⁴⁾。また、関連物質であるビスフェノールAについては、復帰突然変異試験で陰性の結果が得られている⁵⁾。

以上の結果に基づき、4,4'-イソプロピリデンビス(2,6-ジブロモフェノール)は、用いた試験系において変異原性を有しないもの（陰性）と判定した。

【文 献】

- 1) Matsushima, T., Sugimura, T., Nagao, M., Yahagi, T., Shirai, A., Sawamura, M.: Factors modulating mutagenicity in microbial tests. in "Short-term Test Systems for Detecting Carcinogens" Norpeth, K.H., Garner, R.C. eds, Springer, Berlin (1980) pp. 273-285
- 2) Maron, D.M., Ames, B.N. : Revised methods for the *Salmonella* mutagenicity test. *Mutation Research* 113 : 173-215 (1983)
- 3) Green, M.H.L. : Mutagen testing using *Trp⁺* reversion in *Escherichia coli*. in "Handbook of Mutagenicity Test Procedures." Kilbey, B.J., Legator, M., Nichols, W., Ramei, C. eds, Elsevier, Amsterdam (1984) pp. 161-187
- 4) 厚生省生活衛生局企画課生活化学安全対策室監修, “化学物質毒性試験報告,” Vol. 8, 化学物質点検推進連絡協議会, 東京, 2000 (投稿準備中)
- 5) 労働省労働基準局安全衛生部化学物質調査課監修, “労働安全衛生法有害性調査制度に基づく既存化学物質変異原性試験データ集,” 社団法人日本化学物質安全・情報センター, 東京, 1996, pp. 223-224.

Table 1. Cytotoxicity of 4,4'-isopropylidenebis(2,6-dibromophenol) on bacteria

With (+) or without (-) S9 mix	Test substance dose ($\mu\text{g}/\text{plate}$)	Number of revertants (number of colonies / plate, mean \pm S.D.)											
		Base - pair substitution type						Frameshift type					
		TA100			TA1535			WP2 <i>uvrA</i>			TA98		
S9 mix	0	118 (128 \pm 14.6)	145 (16 \pm 4.0)	122 (23 \pm 3.5)	18 (24 \pm 3.8)	18 (24 \pm 3.8)	11 (10 \pm 1.2)	27 (24 \pm 3.8)	23 (24 \pm 3.8)	20 (24 \pm 3.8)	28 (24 \pm 3.8)	22 (24 \pm 3.8)	21 (24 \pm 3.8)
	50.0	136			13			20			15		13
	150	128			8			29			19		2 *
	500 †	109			11 *			17			11		0 *
	1500 †	83 *			8 *			15			8		0 *
	5000 †	79 *			6 *			21			11		3 *
S9 mix	0	108 (134 \pm 24.2)	138 (15 \pm 2.5)	156 (30 \pm 5.7)	15 (30 \pm 7.1)	13 (30 \pm 7.1)	18 (15 \pm 4.5)	36 (30 \pm 7.1)	25 (30 \pm 7.1)	28 (30 \pm 7.1)	29 (30 \pm 7.1)	24 (30 \pm 7.1)	38 (30 \pm 7.1)
	50.0	154			19			33			27		15
	150	160			10			34			36		14
	500	144			9			23			23		7 *
	1500 †	18			9			28			20		14 *
	5000 †	99			10			32			31		16 *
Positive control S9 mix (-)	Chemical	AF2			SA			AF2			AF2		9AA
	Dose ($\mu\text{g}/\text{plate}$)	0.01			0.5			0.01			0.1		80
	Number of colonies / plate	449 (482 \pm 39.5)	472 (636 \pm 12.5)	526 (623 \pm 1.2)	648 (208 \pm 1.2)	636 (625 \pm 12.1)	623 (635 \pm 12.1)	207 (624 \pm 12.1)	209 (624 \pm 12.1)	207 (498 \pm 188.5)	611 (498 \pm 188.5)	625 (498 \pm 188.5)	635 (498 \pm 188.5)
Positive control S9 mix (+)	Chemical	2AA			2AA			2AA			2AA		2AA
	Dose ($\mu\text{g}/\text{plate}$)	1			2			10			0.5		2
	Number of colonies / plate	893 (892 \pm 14.5)	877 (413 \pm 15.1)	906 (430 \pm 37.1)	408 (447 \pm 37.1)	401 (480 \pm 20.8)	430 (521 \pm 20.8)	447 (455 \pm 20.8)	480 (462 \pm 20.8)	521 (432 \pm 20.8)	472 (455 \pm 20.8)	462 (455 \pm 20.8)	432 (455 \pm 20.8)

The purity of the test substance was 99.5%. This substance contained tribromobisphenol A as impurity.

AF2: 2-(2-Furyl)-3-(5-nitro-2-furyl)acrylamide, SA: Sodium azide, 9AA: 9-Aminoacridine, 2AA: 2-Aminoanthracene

*: Inhibition was observed against growth of the bacteria. †: Precipitate was observed on the surface of agar plates.

Table 2-1. Mutagenicity of 4,4'-isopropylidenebis(2,6-dibromophenol) on bacteria (I)

With (+) or without (-) S9 mix	Test substance dose ($\mu\text{g}/\text{plate}$)	Number of revertants (number of colonies / plate, mean \pm S.D.)									
		Base - pair substitution type						Frameshift type			
		TA100			TA1535			WP2 <i>uvrA</i>			TA98
S9 mix (-)	0	139 (148 \pm 8.2)	155 (148 \pm 8.2)	150 (148 \pm 8.2)				27 (26 \pm 3.1)	23 (26 \pm 3.1)	29 (26 \pm 3.1)	32 (27 \pm 4.6)
	78.1	116 (124 \pm 18.0)	112 (124 \pm 18.0)	145 (124 \pm 18.0)				ND			ND
	156	106 (106 \pm 0.6)	107 (106 \pm 0.6)	106 (106 \pm 0.6)				39 (29 \pm 10.6)	31 (29 \pm 10.6)	18 (29 \pm 10.6)	19 (20 \pm 4.2)
	313 †	113 (122 \pm 12.5)	136 (122 \pm 12.5)	116 (122 \pm 12.5)				18 (22 \pm 6.9)	18 (22 \pm 6.9)	30 (22 \pm 6.9)	14 (17 \pm 3.0)
	625 †	87 (104 \pm 15.5)	109 (104 \pm 15.5)	117 (104 \pm 15.5)				20 (24 \pm 7.2)	19 (24 \pm 7.2)	32 (24 \pm 7.2)	26 (20 \pm 6.0)
	1250 †	115 (108 \pm 6.2)	106 (108 \pm 6.2)	103 (108 \pm 6.2)				10 (16 \pm 8.7)	12 (16 \pm 8.7)	26 (12 \pm 2.0)	14 (10 \pm 12)
	2500 †	120 * (113 \pm 7.6)	105 * (113 \pm 7.6)	115 * (113 \pm 7.6)				23 (24 \pm 9.1)	16 (24 \pm 9.1)	34 (22 \pm 5.7)	17 (22 \pm 5.7)
	5000 †		ND					22 (28 \pm 5.6)	33 (28 \pm 5.6)	29 (28 \pm 5.6)	14 (17 \pm 3.8)
S9 mix (+)	0	170 (154 \pm 16.6)	156 (154 \pm 16.6)	137 (154 \pm 16.6)	15 (15 \pm 0.6)	16 (15 \pm 0.6)	15 (15 \pm 0.6)	29 (30 \pm 4.2)	27 (30 \pm 4.2)	35 (30 \pm 4.2)	23 (28 \pm 9.0)
	156	168 (170 \pm 12.7)	184 (170 \pm 12.7)	159 (170 \pm 12.7)	11 (13 \pm 4.7)	9 (13 \pm 4.7)	18 (13 \pm 4.7)	39 (31 \pm 6.7)	28 (31 \pm 6.7)	27 (31 \pm 6.7)	33 (35 \pm 1.5)
	313	161 (154 \pm 13.3)	163 (154 \pm 13.3)	139 (154 \pm 13.3)	12 (13 \pm 4.0)	9 (13 \pm 4.0)	17 (13 \pm 4.0)	24 (29 \pm 5.0)	34 (29 \pm 5.0)	29 (29 \pm 5.0)	36 (31 \pm 7.0)
	625	119 (124 \pm 5.0)	129 (124 \pm 5.0)	125 (124 \pm 5.0)	8 (9 \pm 6.0)	3 (9 \pm 6.0)	15 (9 \pm 6.0)	20 (21 \pm 1.0)	21 (21 \pm 1.0)	22 (21 \pm 1.0)	24 (26 \pm 1.5)
	1250 †	115 (121 \pm 14.0)	111 (121 \pm 14.0)	137 (121 \pm 14.0)	14 (13 \pm 2.1)	11 (13 \pm 2.1)	15 (13 \pm 2.1)	27 (23 \pm 4.0)	23 (23 \pm 4.0)	19 (23 \pm 4.0)	27 (29 \pm 2.1)
	2500 †	127 (104 \pm 21.6)	102 (104 \pm 21.6)	84 (104 \pm 21.6)	8 (8 \pm 5.0)	3 (8 \pm 5.0)	13 (8 \pm 5.0)	17 (18 \pm 3.1)	21 (18 \pm 3.1)	15 (18 \pm 3.1)	24 (27 \pm 6.7)
	5000 †	136 (133 \pm 2.9)	131 (133 \pm 2.9)	131 (133 \pm 2.9)	11 (9 \pm 2.1)	10 (9 \pm 2.1)	7 (9 \pm 2.1)	18 (14 \pm 3.5)	11 (14 \pm 3.5)	14 (14 \pm 3.5)	30 (25 \pm 4.4)
Positive control	Chemical		AF2				AF2			AF2	
S9 mix (-)	Dose ($\mu\text{g}/\text{plate}$)	0.01					0.01			0.1	
	Number of colonies / plate	778 (757 \pm 19.1)	741 (757 \pm 19.1)	751 (757 \pm 19.1)			222 (240 \pm 31.2)	222 (240 \pm 31.2)	276 (240 \pm 31.2)	642 (647 \pm 11.4)	639 (647 \pm 11.4)
Positive control	Chemical	2AA		2AA			2AA			2AA	
S9 mix (+)	Dose ($\mu\text{g}/\text{plate}$)	1		2			10			0.5	
	Number of colonies / plate	1172 (1128 \pm 40.6)	1092 (1128 \pm 40.6)	1120 (1128 \pm 40.6)	387 (345 \pm 41.5)	344 (345 \pm 41.5)	304 (345 \pm 41.5)	782 (790 \pm 64.4)	858 (790 \pm 64.4)	730 (790 \pm 64.4)	521 (494 \pm 39.0)
	ND : Not done										

The purity of the test substance was 99.5%. This substance contained tribromobisphenol A as impurity.

AF2: 2-(2-Furyl)-3-(5-nitro-2-furyl)acrylamide, 2AA : 2-Aminoanthracene

*: Inhibition was observed against growth of the bacteria. †: Precipitate was observed on the surface of agar plates.

ND : Not done

Table 2-2. Mutagenicity of 4,4'-isopropylidenebis(2,6-dibromophenol) on bacteria (I)

With (+) or without (-) S9 mix	Test substance dose ($\mu\text{g}/\text{plate}$)	Number of revertants (number of colonies / plate, mean \pm S.D.)					
		Base - pair substitution type			Frameshift type		
		TA1535			TA1537		
S9 mix (-)	0	10	8	8 (9 \pm 1.2)			12 15 17 (15 \pm 2.5)
	4.88		ND				3 8 7 (6 \pm 2.6)
	9.77		ND				13 13 8 (11 \pm 2.9)
	19.5	10	13	5 (9 \pm 4.0)			11 8 5 (8 \pm 3.0)
	39.1	8	12	10 (10 \pm 2.0)			8 5 5 (6 \pm 1.7)
	78.1	7	6	11 (8 \pm 2.6)			5 6 7 (6 \pm 1.0)
	156	4	5	8 (6 \pm 2.1)			2 * 2 * 2 * (2 \pm 0.0)
	313 †	7 *	7 *	3 * (6 \pm 2.3)			ND
	625 †	5 *	7 *	3 * (5 \pm 2.0)			ND
S9 mix (+)	0						17 24 26 (22 \pm 4.7)
	19.5						9 3 7 (6 \pm 3.1)
	39.1						6 9 7 (7 \pm 1.5)
	78.1						6 7 1 (5 \pm 3.2)
	156						6 * 2 * 1 * (3 \pm 2.6)
	313						9 * 8 * 5 * (7 \pm 2.1)
	625						6 * 7 * 0 * (4 \pm 3.8)
Positive control	Chemical	SA					9AA
S9 mix (-)	Dose ($\mu\text{g}/\text{plate}$)	0.5					80
	Number of colonies / plate	714	748	710 (724 \pm 20.9)			863 972 856 (897 \pm 65.0)
Positive control	Chemical						2AA
S9 mix (+)	Dose ($\mu\text{g}/\text{plate}$)						2
	Number of colonies / plate						397 381 426 (401 \pm 22.8)

The purity of the test substance was 99.5%. This substance contained tribromobisphenol A as impurity.

SA : Sodium azide, 9AA : 9-Aminoacridine, 2AA : 2-Aminoanthracene

*: Inhibition was observed against growth of the bacteria. †: Precipitate was observed on the surface of agar plates.

ND : Not done

Table 2-3. Mutagenicity of 4,4'-isopropylidenebis (2,6-dibromophenol) on bacteria (I)
(retest)

With (+) or without (-) S9 mix	Test substance dose (μ g /plate)	Number of revertants (number of colonies / plate, mean \pm S.D.)				Frameshift type TA1537	
S9 mix (+)	0				19 19 23 (20 \pm 2.3)		
	9.77				11 8 10 (10 \pm 1.5)		
	19.5				12 15 17 (15 \pm 2.5)		
	39.1				11 14 9 (11 \pm 2.5)		
	78.1				12 9 11 (11 \pm 1.5)		
	156				15 * 9 * 10 * (11 \pm 3.2)		
	313				10 * 14 * 15 * (13 \pm 2)		
Positive control S9 mix (+)	Chemical					2AA	
	Dose (μ g /plate)					2	
	Number of colonies / plate					345 336 345 (342 \pm 5.2)	

The purity of the test substance was 99.5%. This substance contained tribromobisphenol A as impurity.

2AA : 2-Aminoanthracene

*: Inhibition was observed against growth of the bacteria.

Table 3-1. Mutagenicity of 4,4'-isopropylidenebis (2,6-dibromophenol) on bacteria (II)

With (+) or without (-) S9 mix	Test substance dose ($\mu\text{g}/\text{plate}$)	Number of revertants (number of colonies / plate, mean \pm S.D.)									
		Base - pair substitution type						Frameshift type			
		TA100		TA1535		WP2 <i>uvrA</i>		TA98			
S9 mix (-)	0	165 (163 \pm 6.2)	168	156		27 (24 \pm 3.1)	25	21	26 (24 \pm 2.0)	24	22
	78.1	119 (143 \pm 21.8)	162	147		ND			ND		
	156	156 (154 \pm 15.6)	137	168		32 (32 \pm 2.5)	35	30	21 (22 \pm 3.6)	26	19
	313 †	138 (147 \pm 21.4)	171	131		27 (30 \pm 2.6)	31	32	16 (16 \pm 2.5)	13	18
	625 †	104 (120 \pm 17.8)	139	116		25 (28 \pm 5.5)	24	34	19 (15 \pm 3.8)	12	
	1250 †	154 (124 \pm 28.6)	122	97		38 (29 \pm 9.5)	19	29	11 (11 \pm 3.5)	8	15
	2500 †	125 * (124 \pm 9.5)	133 *	114 *		26 (29 \pm 4.4)	34	27	14 (14 \pm 3.5)	18	11
	5000 †	ND				35 (29 \pm 6.5)	29	22	17 (15 \pm 1.7)	14	14
S9 mix (+)	0	159 (169 \pm 19.4)	156	191	18 (16 \pm 2.0)	16	14	34 (30 \pm 3.5)	28	28	25 (26 \pm 1.7)
	156	143 (165 \pm 25.0)	192	159	9 (13 \pm 4.5)	18	13	28 (30 \pm 3.2)	29	34	33 (31 \pm 3.8)
	313	181 (174 \pm 12.4)	160	182	6 (10 \pm 3.2)	11	12	22 (24 \pm 3.8)	28	21	36 (28 \pm 6.7)
	625	132 (142 \pm 11.1)	141	154	7 (11 \pm 3.2)	12	13	16 (19 \pm 2.9)	21	21	20 (22 \pm 2.1)
	1250 †	141 (154 \pm 22.2)	180	142	12 (10 \pm 3.5)	12	6	31 (25 \pm 5.5)	22	18	15 (17 \pm 1.7)
	2500 †	137 (138 \pm 3.2)	142	136	11 (11 \pm 0.6)	11	12	21 (19 \pm 2.1)	17	18	12 (20 \pm 6.7)
	5000 †	117 (112 \pm 32.8)	77	142	8 (9 \pm 1.0)	10	9	20 (19 \pm 2.3)	20	16	10 (20 \pm 9.5)
Positive control S9 mix (-)	Chemical	AF2				AF2		AF2			
	Dose ($\mu\text{g}/\text{plate}$)	0.01				0.01		0.1			
	Number of colonies / plate	612 (626 \pm 15.8)	622	643		294 (289 \pm 5.6)	283	290	668 (660 \pm 7.0)	655	657
Positive control S9 mix (+)	Chemical	2AA		2AA		2AA		2AA			
	Dose ($\mu\text{g}/\text{plate}$)	1		2		10		0.5			
	Number of colonies / plate	982 (1006 \pm 21.8)	1010	1025	377 (383 \pm 14.4)	372	399	946 (976 \pm 75.2)	1062	438	481 (453 \pm 24.0)

The purity of the test substance was 99.5%. This substance contained tribromobisphenol A as impurity.

AF2: 2-(2-Furyl)-3-(5-nitro-2-furyl)acrylamide, 2AA : 2-Aminoanthracene

*: Inhibition was observed against growth of the bacteria. †: Precipitate was observed on the surface of agar plates.

ND : Not done

Table 3-2. Mutagenicity of 4,4'-isopropylidenebis (2,6-dibromophenol) on bacteria (II)

With (+) or without (-) S9 mix	Test substance dose ($\mu\text{g}/\text{plate}$)	Number of revertants (number of colonies / plate, mean \pm S.D.)					
		Base - pair substitution type			Frameshift type		
			TA1535				TA1537
(-)	0		13 11 10 (11 \pm 1.5)				15 10 9 (11 \pm 3.2)
	4.88		ND				14 11 12 (12 \pm 1.5)
	9.77		ND				9 8 13 (10 \pm 2.6)
	19.5		6 6 6 (6 \pm 0.0)				7 12 5 (8 \pm 3.6)
	39.1		13 8 16 (12 \pm 4.0)				11 10 7 (9 \pm 2.1)
	78.1		6 12 11 (10 \pm 3.2)				8 5 8 (7 \pm 1.7)
	156		7 13 9 (10 \pm 3.1)				1 * 4 * 3 * (3 \pm 1.5)
	313 †		7 7 8 (7 \pm 0.6)				ND
	625 †		9 * 4 * 11 * (8 \pm 3.6)				ND
(+)	0						15 16 15 (15 \pm 0.6)
	9.77						8 12 16 (12 \pm 4.0)
	19.5						21 13 13 (16 \pm 4.6)
	39.1						14 14 12 (13 \pm 1.2)
	78.1						7 15 13 (12 \pm 4.2)
	156						3 * 6 * 13 * (7 \pm 5.1)
	313						18 * 7 * 8 * (11 \pm 6.1)
Positive control	Chemical		SA				9AA
S9 mix (-)	Dose ($\mu\text{g}/\text{plate}$)		0.5				80
	Number of colonies / plate		705 686 778 (723 \pm 48.6)				626 887 607 (707 \pm 156.5)
Positive control	Chemical						2AA
S9 mix (+)	Dose ($\mu\text{g}/\text{plate}$)						2
	Number of colonies / plate						321 335 285 (314 \pm 25.8)

The purity of the test substance was 99.5%. This substance contained tribromobisphenol A as impurity.

SA : Sodium azide, 9AA : 9-Aminoacridine, 2AA : 2-Aminoanthracene

*: Inhibition was observed against growth of the bacteria. †: Precipitate was observed on the surface of agar plates.

ND : Not done