

最終報告書

4,4'-チオビス(6-tert-ブチル-2-クレゾール)のラットを用いた
経口投与による28日間反復投与毒性試験および2週間回復試験

株式会社ボゾリサーチセンター

目 次

	頁
要 約	1
緒 言	3
試験材料および方法	
1. 被験物質および被験液の調製	4
1) 被験物質	4
2) 対照液および被験液の調製	4
(1) 対照液（溶媒）の調製および保存方法	4
(2) 被験液の調製および保存方法	4
3) 被験液の安定性	5
4) 被験液の濃度および均一性の確認	5
2. 試験動物	5
3. 飼育条件	5
4. 投与量、群構成および動物数	6
5. 個体識別およびケージへの表示	6
6. 投与方法および投与期間	7
7. 検査方法	7
1) 一般状態の観察	7
2) 体重測定	7
3) 摂餌量測定	7
4) 尿検査	7
5) 血液学的検査	8
6) 血液生化学的検査	10
7) 病理学的検査	11
(1) 剖検および器官重量測定	11
(2) 病理組織学的検査	11
8. 統計処理	12

	頁
試驗結果	
1. 一般狀態	1 3
2. 体重	1 3
1) 投与期間	1 3
2) 回復期間	1 3
3. 摂餌量	1 3
1) 投与期間	1 3
2) 回復期間	1 3
4. 尿検査	1 3
1) 投与第4週検査	1 3
2) 回復第2週検査	1 4
5. 血液学的検査	1 4
1) 投与終了時検査	1 4
2) 回復終了時検査	1 4
6. 血液生化学的検査	1 4
1) 投与終了時検査	1 4
2) 回復終了時検査	1 4
7. 剖検所見	1 4
1) 投与終了時剖検例	1 5
2) 回復終了時剖検例	1 5
8. 器官重量	1 5
1) 投与終了時剖検例	1 5
2) 回復終了時剖検例	1 5
9. 病理組織学的検査	1 5
1) 投与終了時剖検例	1 5
2) 回復終了時剖検例	1 7
考 察	1 8
文 献	2 0

Figures and Tables

Fig. 1	Body weight
Fig. 2	Food consumption
Table 1-1~1-3	Clinical signs
Table 2-1、2-2	Body weight
Table 3-1、3-2	Food consumption
Table 4-1~4-8	Urinalysis
Table 5-1~5-4	Hematological findings
Table 6-1~6-4	Blood chemical findings
Table 7-1、7-2	Gross pathological findings
Table 8-1~8-8	Absolute and relative organ weights
Table 9-1~9-5	Histopathological findings

要 約

Crl:CD(SD)系雌雄ラットを用いて、4,4'-チオビス(6-tert-ブチル- α -クレゾール)の反復投与による毒性ならびにその回復性を検討した。投与量は0(5%アラビアゴム水溶液:対照群)、15、60、および250mg/kg/dayとし、28日間強制経口投与した。1群の動物数は、対照群、60および250mg/kg投与群で雌雄各12匹、15mg/kg投与群で雌雄各6匹とし、このうち、対照群、60および250mg/kg投与群の雌雄各6匹については、28日間投与後14日間休薬させた。

1. 試験期間を通じて、死亡はみられず、また、一般状態にも被験物質投与に起因する変化はみられなかった。

2. 体重では被験物質投与による変化はみられなかった。摂餌量では、250mg/kg投与群の雌雄で投与開始初期に一時的な減少がみられたが、雄ではその後対照群をやや上回って推移した。60mg/kg投与群の雄の摂餌量も対照群をやや上回って推移した。

3. 尿検査では、pHの低下が60mg/kg投与群の雌と250mg/kg投与群の雌雄に、尿蛋白およびケトン体の増加が60および250mg/kg投与群の雌でみられた。

4. 血液学的検査では、250mg/kg投与群で雌雄に血小板数の増加、雌に分葉核好中球比率の増加およびリンパ球比率の減少がみられた。

5. 血液生化学的検査では、無機リンの増加が60mg/kg以上の投与群の雌に、総コレステロールの増加が250mg/kg投与群の雌雄に、リン脂質および尿素窒素の増加と血糖値の低下が250mg/kg投与群の雌にみられた。

6. 病理学的検査では、250mg/kg投与群の雌雄に肝臓重量の増加、肉眼的な小腸壁の肥厚と盲腸の拡張がみられた。組織学的には、肝臓で小葉中心帯肝細胞の肥大と回腸における腸絨毛の過形成が250mg/kg投与群の雌雄に、盲腸と結腸で吸収上皮細胞の空胞化が60mg/kg以上の投与群の雌雄に、また、盲腸粘膜の細胞浸潤が60mg/kg以上の投与群の雌雄に、結腸粘膜の細胞浸潤が60mg/kg以上の投与群の雌にみられた。さらに、腸間膜リンパ

節では、傍皮質領域における“tingible body macrophage”が250mg/kg投与群の雌に多くみられた。

7. 14日間の休薬後も、250mg/kg投与群で尿pHの低下、尿蛋白の増加、血小板数の増加、回腸における腸絨毛の過形成がみられたものの、その他の変化は認められなかった。

以上の結果から、本試験における4,4'-チオビス(6-tert-ブチル- π -クレゾール)の無影響量は15mg/kg/dayと推定された。

緒 言

4,4'-チオビス(6-tert-ブチル- μ -クレゾール)は、サルモネラを用いた変異原性では陰性を示すことが報告されている¹⁾。

今回、厚生省生活衛生局の依頼により、4,4'-チオビス(6-tert-ブチル- μ -クレゾール)をヒトが摂取した場合の影響を推定する目的で、被験物質をラットに28日間反復経口投与し、その影響を明らかにするとともに、2週間休薬し、障害の回復性を調べたのでその成績を報告する。

なお、本試験は「新規化学物質に係る試験および指定化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める命令第4条に規定する試験施設について（昭和63年11月18日；環保業第39号環境庁企画調整局長、薬発第229号厚生省薬務局長、59基局第85号通商産業省基礎産業局長連名基準）」に定める「新規化学物質に係る試験および指定化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める命令第4条に規定する試験施設に関する基準」および「新規化学物質に係る試験の方法について（昭和61年12月5日；環保業第700号環境庁企画調整局長、薬発第1039号厚生省薬務局長、61基局第1014号通商産業省基礎産業局長連名通知）」（以下「化審法ガイドライン」という）に準拠して実施した。

試験材料および方法

1. 被験物質および被験液の調製

1) 被験物質

被験物質4,4'-チオビス(6-tert-ブチル- μ -クレゾール)は以下の情報とともに、より提供された。

製造者 :

被験物質名 : 4,4'-チオビス(6-tert-ブチル- μ -クレゾール)
(CAS No. : 96-69-5)

構造式または示性式 : $S[C_6H_2(CH_3)(OH)C(CH_3)_3]_2$

ロット番号 :

純度 : 98%以上

性状 : 白色結晶性粉末で、水に不溶、アセトンおよびメタノールに可溶。

分子量 : 358.54

融点 : 160~165℃

保存方法 : 室温・暗所

安定性 : 返却後の被験物質の分析結果から、動物試験期間中は安定であったことが確認された。

保存方法 : 室温・暗所保存

なお、提供された被験物質のうち、約5gを保管試料として御殿場研究所の被験物質保管室に保管し、その他の残余被験物質は全量を製造者に返却した。

2) 対照液および被験液の調製

(1) 対照液(溶媒)の調製および保存方法

必要量のアラビアゴム(日本薬局方、日本粉末薬品株式会社、ロット番号: JH4104)を秤量し、最終調製量の約8割の注射用水(日本薬局方、株式会社大塚製薬工場、ロット番号: 4184)に、スターラーで攪拌しながら徐々に加えて完全に溶解させたのち注射用水をさらに加えて規定量とし、5%アラビアゴム水溶液を調製した。調製は最大1週間分を一括して行い、使用時まで室温で保存した。

(2) 被験液の調製および保存方法

投与容量が5ml/kg体重となるよう、各濃度毎に必要な被験物質を秤取し、乳鉢

を用いて溶媒に懸濁して調製した。被験液の調製は最大1週間分を一括して行い、1日分ずつ褐色ガラス瓶に分注し、冷蔵庫（約4℃）に保存した。

3) 被験液の安定性

0.1～5%（%）懸濁液は、室温で1日間および冷蔵（約4℃）・暗所（褐色ガラス瓶）で8日間まで安定である（添付資料 1）。

4) 被験液の濃度および均一性の確認

投与開始前および投与終了週の2回、投与に使用した各濃度液について、株式会社ボゾリサーチセンターで測定した結果、表示値に対する割合は94.0～104.2%、また、変動係数（CV）は0.3～0.8%の範囲内であり、いずれも適正濃度でかつ均一であることが確認された（添付資料 2、3）。

2. 試験動物

Crl:CD(SD)系SPFラット（日本チャールス・リバー株式会社）の雌雄各60匹^{#1}を5週齢で購入し、当所で約1週間検疫・馴化飼育した後、体重増加が順調で一般状態に異常を認めなかった雌雄各42匹を選び、6週齢で試験に供した。投与開始日の体重範囲は、雄で193～222g（平均値：208.0g）、雌で148～171g（平均値：157.4g）であり、いずれの動物の体重も平均値±20%以内であった。

動物は、検疫・馴化期間中の体重増加量により選別後、群分け当日（雌雄とも投与開始の4日前）の体重に基づいて層別化し、各群の平均体重がほぼ均等となるよう、コンピュータを用いてブロック配置法および無作為抽出法の組合せ（ブロック配置法で必要な群を構成し、試験群および群内の個体番号を無作為に割り当てた）により各群に割り付けた。

群分け後の余剰動物は、投与開始日に安楽死させた。

^{#1}：試験計画書に従い、注文匹数は雌雄各60匹であったが、実際には雌雄各62匹が納入された。

3. 飼育条件

動物は、温度 $23 \pm 3^{\circ}\text{C}$ 、相対湿度 $50 \pm 20\%$ 、換気回数1時間当たり11～13回、照明1日12時間（午前7時～午後7時）の飼育室（602号室）で、金属製網ケージ（W 190×D 350×H 170 mm：リードエンジニアリング株式会社）に1匹ずつ収容し、固型飼料（放射線滅菌CRF-1、オリエンタル酵母工業株式会社）および飲料水（御殿場市営水道水：自動給水）を自由に摂取させ飼育した。なお、飼料中の汚染物質等に関し

ては、使用した全ロットについて財団法人日本食品分析センターで分析したデータを入力し)、また、飲料水については、水道法に準拠した水質の検査を財団法人静岡県生活科学検査センターに定期的(年4回)に依頼し、得られたデータを入力してそれぞれ異常のないことを確認して保管した。

4. 投与量、群構成および動物数

投与量は、2週間投与による予備試験²⁾の成績を参考にして、すなわち、4,4'-チオビス(6-tert-ブチル- μ -クレゾール)の15、60、250および1000mg/kgを雌雄のラットに2週間反復経口投与した結果、1000mg/kg投与群で多数例が死亡し、250mg/kg投与群ではGOTおよびGPT活性の上昇、血糖値の低下、盲腸の拡張などがみられた。一方、60mg/kg以下の投与群では変化はみられなかった。これらの結果から、本試験では明らかな毒性徴候が予想される250mg/kgを最高投与量とし、以下公比約4で減じて60および15mg/kgの3用量を設定した。これに对照群を加え計4群を使用した。28日間投与後に剖検する群(主群)に雌雄各6匹を用い、さらに、对照群、中用量群および高用量群では28日間投与後2週間休薬した後に剖検する群(回復群)に雌雄各6匹を用いた。次に群構成表を示す。

試験群	投与量 (mg/kg)	投与液 濃度 (%)	性	主 群		回 復 群	
				動物数	動物番号	動物数	動物番号
対 照 群	0	0	雄	6	1001~1006	6	1007~1012
			雌	6	1101~1106	6	1107~1112
低 用 量 群	15	0.3	雄	6	2001~2006	-	-
			雌	6	2101~2106	-	-
中 用 量 群	60	1.2	雄	6	3001~3006	6	3007~3012
			雌	6	3101~3106	6	3107~3112
高 用 量 群	250	5	雄	6	4001~4006	6	4007~4012
			雌	6	4101~4106	6	4107~4112

5. 個体識別およびケージへの表示

個体識別は、入荷時に小動物用耳標をつけて行った。また、飼育ケージには、投与量ごとに色分けしたケージラベルに試験番号、投与経路、投与量、性、動物番号、耳標番号お

よび剖検日を明記し、表示した。

6. 投与方法および投与期間

「化審法ガイドライン」に準じて経口投与を選択した。被験液は、 $0.5\text{ml}/100\text{g}$ 体重の投与容量で、1日1回（午前8時～午後3時の間）、週7日、金属製胃ゾンデを用いて28日間（計29回）強制経口投与した。対照群には溶媒（5%アラビアゴム水溶液）を同様に投与した。投与液量は最新の体重を基準に算出した。なお、回復期間は2週間とし、この間休養させた。

7. 検査方法

1) 一般状態の観察

投与期間中は毎日3回、投与前と投与直後および投与2時間後（ただし、休日は投与前と投与直後の2回）、回復期間中は毎日1回（午前中）、症状の有無、行動異常の有無を観察した。

なお、以下、投与開始日を投与1日、投与1～7日を投与第1週と起算した。

2) 体重測定

投与開始日の投与前に1回測定し、その後は3日ないし4日間隔で週2回、当日の投与前（午前中）に測定した。回復期間中は回復1日（投与期間終了の翌日）および3日に測定し、その後は3日ないし4日間隔で週2回測定した。また、相対器官重量算出のため、投与終了時および回復終了時の剖検日にも絶食後の体重を測定した。

3) 摂餌量測定

投与開始日の投与前に1回、前日からの1日量を測定した。その後の投与期間中は3日あるいは4日間隔で週2回、3日ないし4日間の累積摂取量を当日の投与前に測定し、1匹1日量を算出した。回復期間中は、回復1日から3日までの累積摂取量を測定し、その後は3日あるいは4日間隔で週2回、3日ないし4日間の累積摂取量を測定して、1匹1日量を算出した。なお、測定は午前中に行った。

4) 尿検査

投与第4週および回復第2週に行った。

投与第4週（投与23日～25日の間）は、検査当日の投与後に主群の全動物について、回復第2週（回復8日～11日の間）は回復群の全動物について、個別に代謝ケージに収容し、絶食・自由摂水下で4時間尿を、次いで自由摂食・自由摂水下でそ

の後の20時間尿を採取した。検査項目は次の通りである。なお、採取した最初の4時間尿についてpH以下沈渣までの検査と尿量を、その後に得られた20時間尿を用いて尿比重および尿量の測定を行い、尿量は4時間の尿量および20時間の尿量を合計して算出した。摂水量は、代謝ケージに収容した状態で前日からの1日の摂取量を、給水瓶を用いて測定した。

検査項目	測定方法
pH	URIFLET 7A [㈱京都第一科学] ^{a)}
蛋白質 (Protein)	URIFLET 7A [㈱京都第一科学] ^{a)}
ケトン体 (Ketone body)	URIFLET 7A [㈱京都第一科学] ^{a)}
ブドウ糖 (Glucose)	URIFLET 7A [㈱京都第一科学] ^{a)}
潜血 (Occult blood)	URIFLET 7A [㈱京都第一科学] ^{a)}
ビリルビン (Bilirubin)	URIFLET 7A [㈱京都第一科学] ^{a)}
ウロビリノーゲン (Urobilinogen)	URIFLET 7A [㈱京都第一科学] ^{a)}
色調 (Color)	肉眼観察
沈渣 (Urine sediment)	鏡検法
尿量 (24時間量)	容量測定
比重 (S. G.)	屈折法 ^{b)}
摂水量 (24時間量)	重量法

使用測定機器

- a) : mini AUTION ANALYZER
MA-4210 (株式会社京都第一科学)
- b) : アタゴ屈折計 (株式会社アタゴ)

5) 血液学的検査

投与期間および回復期間終了の翌日の屠殺時に、前日から一夜(約16時間)絶食させた全動物を、エーテル麻酔下に開腹し、腹大動脈から抗凝固剤(EDTA-2K)を加えた採血ビン(SB-41:東亜医用電子株式会社)に血液を採取し、以下の項目について測定した。ただし、プロトロンビン時間および活性化部分トロンボプラス

チン時間については、3.8%クエン酸ナトリウムを加えた容器に採取した血液を遠心分離（3000rpm、10分間）し、得られた血漿を用いて測定した。

測定項目	測定方法	単位
赤血球数（RBC）	電気抵抗変化検出法 ^{c)}	$10^4 / \text{mm}^3$
ヘモグロビン量（Hb）	シアンメトヘモグロビン法 ^{c)}	g / dl
ヘマトクリット値（Ht）	$\frac{\text{平均赤血球容積} (\mu^3) \times \text{赤血球数} (10^4 / \text{mm}^3)^{c})}{10^3}$	%
平均赤血球容積（MCV）	電気抵抗変化検出法 ^{c)}	μ^3
平均赤血球血色素量（MCH）	$\frac{\text{ヘモグロビン量} (\text{g} / \text{dl}) \times 10^{c1}}{\text{赤血球数} (10^6 / \text{mm}^3)}$	μg
平均赤血球血色素濃度（MCHC）	$\frac{\text{ヘモグロビン量} (\text{g} / \text{dl}) \times 10^{c2}}{\text{ヘマトクリット値} (\%)}$	%
網赤血球率（Reticulocyte）	Brecher法	%
血小板数（Platelet）	電気抵抗変化検出法 ^{c)}	$10^4 / \text{mm}^3$
白血球数（WBC）	電気抵抗変化検出法 ^{c)}	$10^2 / \text{mm}^3$
白血球百分率	May-Giemsa 鏡検法	%
プロトロンビン時間（PT）	クロット法 ^{d)}	sec.
活性化部分トロンボプラスチン時間（APTT）	クロット法 ^{d)}	sec.

使用測定機器

c) : コールター全自動8項目血球アナライザーT890

(株式会社 日科機)

d) : 血液凝固自動測定装置 ACL 100

(Instrumentation Laboratory)

6) 血液生化学的検査

血液学的検査のための採血と同時に、腹大動脈から採取した血液を30分～1時間室温で放置した後、遠心分離(3000rpm、10分間)し、得られた血清を用いて以下の項目について測定した。ただし、GOT、GPT、LDH、 γ -GTPおよびChEについてはヘパリンを加えた容器に採取後、遠心分離(3000rpm、10分間)し、得られた血漿を用いて測定した。

測定項目	測定方法	単位
GOT	UV-rate法 ^{e)}	IU/ ℓ
GPT	UV-rate法 ^{e)}	IU/ ℓ
LDH	UV-rate法 ^{e)}	IU/ ℓ
γ -GTP	γ -Glu-DBMA-rate法 ^{e)}	IU/ ℓ
ChE	DTNB法 ^{e)}	IU/ ℓ
ALP	Bessey-Lowry法 ^{e)}	IU/ ℓ
総コレステロール (T. cho)		
	CEH-COD-POD法 ^{e)}	mg/dl
トリグリセライド (TG)	GK-GPO-POD法 ^{e)}	mg/dl
リン脂質 (PL)	PLD-ChOD-POD法 ^{e)}	mg/dl
総ビリルビン (T. bilirubin)		
	アゾビリルビン法 ^{e)}	mg/dl
血糖 (Glucose)	Hexokinase-G6PD法 ^{e)}	mg/dl
尿素窒素 (BUN)	Urease-GLDH法 ^{e)}	mg/dl
クレアチニン (Creatinine)		
	Jaffe法 ^{e)}	mg/dl
ナトリウム (Na)	イオン選択電極法 ^{e)}	mEq/ ℓ

測定項目	測定方法	単位
カリウム (K)	イオン選択電極法 ^{e)}	mEq / ℓ
塩素 (Cl)	イオン選択電極法 ^{e)}	mEq / ℓ
カルシウム (Ca)	OCPC法 ^{e)}	mg / dℓ
無機リン (P)	モリブデン酸法 ^{e)}	mg / dℓ
総蛋白質 (TP)	Biuret 法 ^{e)}	g / dℓ
アルブミン (Albumin)	BCG法 ^{e)}	g / dℓ
A/G比 (A/G)	総蛋白質およびアルブミンから算出	

使用測定機器

e) : 自動分析装置 Monarch (Instrumentation Laboratory)

7) 病理学的検査

(1) 剖検および器官重量測定

全動物について、採血後放血致死させ、外表異常の有無を観察した後、頭部、胸部および腹部を含む全身の器官・組織について、肉眼的に異常の有無を観察した。続いて、以下に示す器官について摘出後、器官重量（絶対重量）を測定した。また、絶食後の体重および絶対重量から体重100g当たりの相対重量を算出した。なお、両側性の器官は左右別々に測定したが、左右合計の重量も算出し、合計の値で評価した。

脳、胸腺、心臓、肺（気管支を含む）、肝臓、脾臓、腎臓、副腎、精巣、卵巣

(2) 病理組織学的検査

全動物について以下に示す全器官・組織を採取し、リン酸緩衝液（1/15M、pH 7.1～7.4）で調製した10%ホルマリン液（但し、眼球およびハーダー腺は3%グルタルアルデヒド・2.5%ホルマリン液）で固定後、下線を施した器官・組織についてパラフィン包埋した。主群ではこのうち、対照群と高用量群は包埋した全ての器官・組織について、また、中および低用量群は高用量群で被験物質投与による変化が疑われた小腸（十二指腸～回腸）、大腸（盲腸～直腸）、肝臓および腸間膜リンパ節について切片とし、ヘマトキシリン・エオジン（H・E）染色を施して鏡検した。回復群についても、被験物質投与による変化が疑われた上記の腸管、肝臓および腸間膜リンパ節について全動物を検査した。また、肉眼的異常部位について

は用量に関係なく鏡検した。さらに、正常および異常所見の代表例について写真を撮影した。

脳、脊髄、坐骨神経、胸大動脈、心臓、気管、肺（気管支を含む）、舌、食道、胃、十二指腸、空腸、回腸、盲腸、結腸、直腸、唾液腺（顎下腺・舌下腺）、肝臓、脾臓、下垂体、甲状腺（上皮小体を含む）、副腎、胸腺、脾臓、腸間膜リンパ節、頸部リンパ節、腎臓、膀胱、精巣、精巣上体、精囊、前立腺、卵巣、子宮、腔、乳腺、皮膚、眼球、ハーダー腺、骨及び骨髓（胸骨・大腿骨）、大腿筋、肉眼的異常部位

8. 統計処理

各検査項目のうち数値化した成績について、まず Bartlett 法により各群の分散の均一性の検定を行った。その結果、分散が均一の場合には一元配置法による分散分析を行い、群間に有意差が認められたならば、各群の例数が等しいときには Dunnett 法を、各群の例数が異なるときには Scheffé 法を用いて、対照群と各投与群との平均値の差の検定を行った。分散が均一でない場合には、Kruskal-Wallis の順位検定を行い、有意であれば対照群と各投与群との平均順位の差について、Dunnett 型（各群の例数が等しいとき）、または、Scheffé 型（各群の例数が異なるとき）を用いて、対照群と各投与群との平均順位の差の検定を行った。検定はいずれも両側で、有意水準は 5 および 1 % とした³⁾。

試験結果

1. 一般状態

成績をTable 1-1~1-3、Appendix 1~11に示した。

投与期間および回復期間を通じて、いずれの動物にも異常はみられなかった。

2. 体重

成績をFig. 1、Table 2-1、2-2、Appendix 12~18に示した。

1) 投与期間

雌雄ともに、各投与群の体重は対照群と同様に推移した。

2) 回復期間

雌雄ともに、各投与群の体重は対照群と同様に推移した。

3. 摂餌量

成績をFig. 2、Table 3-1、3-2、Appendix 19~25に示した。

1) 投与期間

雄では、250mg/kg投与群で投与4日に対照群を有意に下回った。しかし、その後は対照群をやや上回って推移し、投与22日および29日には有意な差であった。また、60mg/kg投与群でも対照群をやや上回って推移し、投与29日には有意な差がみられた。

雌では、250mg/kg投与群で投与4日に対照群を有意に下回ったが、その後は対照群と同様に推移した。

2) 回復期間

雌雄ともに、各投与群の摂餌量は対照群と同様に推移した。

4. 尿検査

成績をTable 4-1~4-8、Appendix 26~46に示した。

1) 投与第4週検査

雄では、250mg/kg投与群に尿pHの低下傾向と尿沈渣中のリン酸塩の増加傾向がみられた。

雌では、60mg/kg以上の投与群で尿pHの低下傾向、尿蛋白、ケトン体および尿沈渣

中のリン酸塩の増加傾向がみられた。

2) 回復第2週検査

雄では、250mg/kg投与群に尿蛋白の増加傾向がみられた。

雌では、250mg/kg投与群で尿pHの低下傾向がみられた。

5. 血液学的検査

成績をTable 5-1～5-4、Appendix 47～60に示した。

1) 投与終了時検査

雄では、250mg/kg投与群で血小板数の有意な増加がみられた。他に、プロトロンビン時間の有意な短縮が60mg/kg投与群にみられたが、用量に応じた変化ではなかった。

雌では、250mg/kg投与群で血小板数および分葉核好中球比率の有意な増加とリンパ球比率の有意な減少がみられた。

2) 回復終了時検査

雌雄ともに、250mg/kg投与群で血小板数の有意な増加がみられた。

6. 血液生化学的検査

成績をTable 6-1～6-4、Appendix 61～74に示した。

1) 投与終了時検査

雄では、250mg/kg投与群で総コレステロールの有意な増加がみられた。

雌では、60mg/kg以上の投与群で無機リンの有意な増加がみられたほか、250mg/kg投与群で総コレステロール、リン脂質および尿素窒素の有意な増加と血糖値の有意な低下がみられた。

2) 回復終了時検査

血糖の有意な低下が250mg/kg投与群の雄でみられた。他に、総コレステロールとリン脂質の有意な増加が60mg/kg投与群の雌でみられたが、用量に関連した変化ではなかった。

7. 剖検所見

成績をTable 7-1、7-2、Appendix 75～88に示した。

1) 投与終了時剖検例

盲腸の拡張が 250mg/kg 投与群の雄 5 例と雌 4 例に、小腸壁の肥厚が 250mg/kg 投与群の雌雄各 4 例にみられた。

他に、甲状腺の腫大（両側性）が 15mg/kg 投与群の雌 1 例（No. 2103）にみられたが、出現状況から偶発所見と判断した。

2) 回復終了時剖検例

精巣の腫大（片側性）が 60mg/kg 投与群の雄 1 例（No. 3010）に、精巣上体の黄色小結節が 250mg/kg 投与群の雄 1 例（No. 4011）にみられたが、出現状況からいずれも偶発所見と判断した。

8. 器官重量

成績を Table 8-1～8-8、Appendix 89～116 に示した。

なお、両側性の器官は左右別々に測定したが、左右合計の重量も算出し、合計の値で評価した。

1) 投与終了時剖検例

肝臓で、相対重量の有意な増加が 250mg/kg 投与群の雌雄にみられた。

2) 回復終了時剖検例

心臓で、相対重量の有意な増加が雄の各投与群にみられた。

他に、脳の絶体重量の有意な増加が雌の 60mg/kg 投与群にみられたが、用量と関連した変化ではなかった。

9. 病理組織学的検査

成績を Table 9-1～9-5、Appendix 117～120 に、また代表例の写真を Photo. 1～22 に示した。

1) 投与終了時剖検例

被験物質投与によると考えられる変化が小腸、大腸、肝臓および腸間膜リンパ節にみられた。

回腸：腸絨毛のごく軽度な過形成（Photo. 3、4）が 250mg/kg 投与群の雄 1 例と雌 3 例にみられた。本所見は、腸絨毛の丈の高さの増大として観察され、組織構築の変化あるいは炎症反応は認められなかった。

盲腸：吸収上皮細胞のごく軽度から軽度な空胞化（Photo. 8、9）が 60mg/kg 投

与群の雄3例と雌1例、250mg/kg投与群の雌雄各5例にみられた。また、粘膜におけるごく軽度から軽度な細胞浸潤（Photo. 11、12）が60mg/kg投与群の雄5例と雌1例、250mg/kg投与群の雌雄各3例にみられたが、吸収上皮細胞の空胞化を示す個体と細胞浸潤を示す個体とは必ずしも一致していなかった。

結腸：吸収上皮細胞のごく軽度な空胞化（Photo. 14、15）が60mg/kg投与群の雌雄各1例、250mg/kg投与群の雄1例と雌2例にみられた。また、粘膜におけるごく軽度な細胞浸潤（Photo. 17、18）が雌の60および250mg/kg投与群でそれぞれ1および2例にみられた。

直腸：粘膜におけるごく軽度な細胞浸潤が250mg/kg投与群の雌雄各1例にみられた。

肝臓：小葉中心帯肝細胞のごく軽度な肥大（Photo. 20）が250mg/kg投与群の雌雄各5例にみられた。他に、変異細胞巣（対照群の雄1例）と微小肉芽腫（60mg/kg投与群の雌1例）がみられたが、出現状況から偶発所見と判断した。

腸間膜リンパ節：傍皮質領域において、核崩壊物を容れたマクロファージ

“tingible body macrophage”の出現（Photo. 22）が、対照群で雄1例（ごく軽度）、15mg/kg投与群で雌雄各1例（いずれもごく軽度）、60mg/kg投与群で雄1例と雌2例（いずれもごく軽度）にみられたのに対し、250mg/kg投与群では雄で2例（1例がごく軽度、残る1例が軽度）と雌で5例（4例がごく軽度、残る1例が軽度）にみられ、250mg/kg投与群の雌で例数がやや多かった。

上記以外の器官・組織では、以下の変化がみられたが、出現状況とその病理学的性状からいずれも偶発所見と判断した。

腎臓：近位尿細管の限局性好塩基性化（250mg/kg投与群の雄1例）。

前立腺：炎症（対照群の1例）。

甲状腺（上皮小体を含む）：濾胞上皮細胞のび慢性過形成（肉眼的に腫大を示した15mg/kg投与群の雌1例）。

投与終了時剖検例で検索したその他の器官・組織、すなわち、脳、脊髄、坐骨神経、心臓、気管、肺（気管支を含む）、胃、十二指腸、空腸、膵臓、下垂体、副腎、胸腺、脾臓、頸部リンパ節、膀胱、精巣、精巣上体、卵巣、子宮、陰、眼球、骨および骨髄（胸骨・大腿骨）には異常所見は認められなかった。

2) 回復終了時剖検例

回腸：腸絨毛のごく軽度から軽度な過形成 (Photo. 5、6) が、250mg/kg投与群の雌雄各2例にみられた。

盲腸：吸収上皮細胞の変化は認められなかった。なお、粘膜におけるごく軽度から軽度な細胞浸潤が対照群で雌雄各2例、60mg/kg投与群で雄2例と雌1例、250mg/kg投与群で雄3例と雌4例にみられた。

直腸：粘膜におけるごく軽度な細胞浸潤が60mg/kg投与群の雌1例、250mg/kg投与群の雄1例にみられた。

肝臓：肝細胞の肥大は認められなかった。なお、ごく軽度な微小肉芽腫が対照群の雌雄各1例、250mg/kg投与群の雄1例にみられた。

肉眼的異常部位：肉眼的に腫大を示した60mg/kg投与群の1例 (No. 3010) の精巣では精細管の萎縮、黄色小結節を示した250mg/kg投与群の1例 (No. 4011) の精巣上体では精子肉芽腫がみられた。

回復終了時剖検例で検索したその他の器官・組織、すなわち、十二指腸、空腸、結腸および腸間膜リンパ節には異常所見は認められなかった。

考 察

Crlj:CD (SD) 系雌雄ラットに、4,4'-チオビス (6-*tert*-ブチル- μ -クレゾール) を 0 (5%アラビアゴム水溶液)、15、60および 250mg/kg/day の用量で28日間反復強制経口投与し、その毒性を検討するとともに、60および 250mg/kg投与群についてはその後14日間休薬させ、変化の回復性について検討した。

試験期間を通じて死亡はみられず、また、一般状態および体重推移にも被験物質投与による変化は認められなかった。

摂餌量では、250mg/kg投与群の雌雄で投与開始4日に減少を示したが、雄ではその後対照群をやや上回った。60mg/kg投与群でも雄の摂餌量は対照群をやや上回った。これらの投与群の体重は、対照群とほぼ同様であったことから、食餌効率は低下しているものと考えられ、後述の腸管に対する障害がその要因と推察される。

尿検査では、60mg/kg以上の投与群で尿 pHの低下、尿蛋白およびケトン体の増加が主として雌にみられた。同時に、血液生化学的検査において、雌で尿素窒素や無機リンの増加がみられたことから、尿蛋白の増加は本被験物質の腎臓に対する影響と考えられるが、腎臓では組織学的変化は認められなかった。また、250mg/kg投与群の雌の血糖値は低下していたことから、尿中ケトン体の増加は、血糖値の低下に伴い、エネルギー源としての脂質要求が増大したためと推察される。

血液学的検査では、血小板数の増加、リンパ球比率の減少と分葉核好中球比率の増加が250mg/kg投与群の主として雌にみられた。250mg/kg投与群の雌におけるリンパ球および分葉核好中球の実数を、白血球数とその分画比率から求めると、リンパ球数は対照群平均値の約20%増、分葉核好中球数は対照群平均値の約160%増であったことから、本試験における白血球分画比率の変化は、分葉核好中球の実質的な増加に起因し、大腸粘膜での細胞浸潤との関連性が示唆される。

血液生化学的検査では、既に述べた血糖、尿素窒素および無機リンの変動のほか、総コレステロールとリン脂質の増加が250mg/kg投与群にみられ、脂質代謝への影響も示唆された。

病理学的検査では、小腸、大腸、腸間膜リンパ節および肝臓に変化がみられた。小腸では、肉眼的な壁の肥厚が250mg/kg投与群にみられ、組織学的には、回腸で腸絨毛の過形成がみられた。既に述べた如く、60mg/kg以上の投与群では食餌効率の低下が示唆された

が、小腸における形態学的変化は、消化・吸収能の低下に対する適応的な生体反応と考えられる。また、大腸では、肉眼的な盲腸の拡張が 250mg/kg 投与群にみられ、組織学的には盲腸および結腸で吸収上皮細胞の空胞化および粘膜の細胞浸潤が 60mg/kg 以上の投与群にみられ、大腸に対する障害性が示唆された。ただし、吸収上皮細胞の変化を示す個体と細胞浸潤を示す個体とは必ずしも一致せず、両者の関連性は明らかでなかった。腸間膜リンパ節では、傍皮質領域における“tingible body macrophage”が 250mg/kg 投与群にやや多くみられた。この変化は、頸部リンパ節や胸腺、脾臓など他のリンパ器官では認められなかったことから、腸管障害と関連した所見であり、リンパ系器官に対する直接的な作用ではないと考えられる。なお、投与終了時剖検例のうち、250mg/kg 投与群の雌雄各 1 例に、直腸粘膜の細胞浸潤がみられたが発現例数が少なく、また、この種の動物では背景的に観察されることから、被験物質投与との関連性はないと判断された。

肝臓では、250mg/kg 投与群で重量が増加し、組織学的には小葉中心帯肝細胞の肥大が認められた。血液生化学的検査では、GOT や GPT 活性など肝機能障害を示す所見はみられなかったことから、肝臓の組織所見は、薬物代謝酵素の誘導を示唆するもの⁴⁾と推察される。

休薬期間終了後には、被験物質投与に関連すると考えられる変化のうち、250mg/kg 投与群の尿 pH の低下、尿蛋白の増加、血小板数の増加および回腸における腸絨毛の過形成を除く所見は認められず、概ね可逆性の変化と考えられた。

以上の如く、4,4'-チオビス(6-tert-ブチル- π -クレゾール)をラットに 28 日間反復投与した結果、主な変化が 60mg/kg 以上の投与群の大腸に、さらに 250mg/kg 投与群では小腸および肝臓にみられ、本被験物質の主な標的器官は腸管と肝臓と考えられた。一方、15mg/kg 投与群では変化は認められなかった。これらの結果から、本試験における 4,4'-チオビス(6-tert-ブチル- π -クレゾール)の無影響量は 15mg/kg/day と推定された。

文 献

- 1) E. Zeiger, B. Anderson, S. Haworth, T. Lawlor, K. Mortelmans, and W. Speck (1987).

Salmonella mutagenicity tests : III. Results from the testing of 255 chemicals. *Environ. Mutagen.*, 9 (Suppl.9) : 1 ~ 109.

- 2)

4,4'-チオビス(6-*tert*-ブチル- μ -クレゾール)のラットを用いた経口投与による14日間反復投与毒性試験(予備試験)(株式会社ボソリサーチセンター
試験番号 : B-2813, 1995年6月)

- 3) S. C. Gad and C. S. Weil (1989).

Chapter 15. Statistics for toxicologists. In "Principles and Methods of Toxicology" 2nd Edition, edited by A. Wallace Hayes, Raven Press, Ltd., New York, pp. 435-483.

- 4) J. R. Glaister (1986).

毒性病理学の基礎. 高橋道人監訳, 1992年日本語版, ソフトサイエンス社, 東京, pp. 95~98.




Fig.1 Body weight of rats administered orally with 4,4'-Thiobis (6-tert-butyl-m-cresol) for 28 days




Fig.2 Food consumption of rats administered orally with 4,4'-Thiobis (6-tert-butyl-m-cresol) for 28 days

Table 1-1 Clinical signs of rats administered orally with 4,4'-Thiobis (6-tert-butyl-m-cresol) for 28 days

[illegible]

Table 1-2

Clinical signs of rats administered orally with 4,4'-Thiobis (6-tert-butyl-m-cresol) for 28 days

[illegible]

Table 1-3

Clinical signs of rats administered orally with 4,4'-Thiobis (6-tert-butyl-m-cresol) for 28 days and followed by a recovery period for 14 days

[illegible]

Table 2-1 Body weight of rats administered orally with 4,4'-Thiobis (6-tert-butyl-m-cresol) for 28 days

Sex	Dose mg/kg		Day of administration								Gain 1-29	
			1	4	8	11	15	18	22	25		29
Male	0	No.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
		Mean	207	232	268	298	335	360	386	404	424	217
		S.D.	8	10	12	15	17	19	24	29	29	26
	15	No.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		Mean	208	234	272	302	339	362	392	405	431	223
		S.D.	7	9	13	16	18	20	23	31	30	24
	60	No.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
		Mean	208	235	272	303	343	367	397	412	435	227
		S.D.	7	9	14	18	24	29	35	36	40	36
	250	No.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
		Mean	209	227	265	297	336	360	389	402	425	216
		S.D.	6	9	9	11	8	10	14	16	15	13
Female	0	No.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
		Mean	156	166	179	192	205	214	227	235	244	88
		S.D.	6	8	8	14	17	18	21	20	20	16
	15	No.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		Mean	158	172	186	199	217	230	243	250	260	102
		S.D.	6	8	11	14	15	12	13	17	16	12
	60	No.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
		Mean	159	169	182	197	210	223	235	242	253	94
		S.D.	6	6	7	12	15	16	17	18	21	17
	250	No.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
		Mean	157	167	182	191	205	216	225	230	239	82
		S.D.	7	7	9	11	13	12	13	16	16	13

Unit : g

No significant difference in any treated groups from control group.

Table 2-2

Body weight of rats administered orally with 4,4'-Thiobis (6-tert-butyl-m-cresol) for 28 days and followed by a recovery period for 14 days

Sex	Dose mg/kg		Day of recovery					Gain 1-14
			1	3	7	10	14	
Male	0	No.	6	6	6	6	6	6
		Mean	443	459	479	489	508	65
		S.D.	28	29	31	32	36	9
	60	No.	6	6	6	6	6	6
		Mean	423	431	452	459	479	56
		S.D.	36	38	43	39	41	13
	250	No.	6	6	6	6	6	6
		Mean	428	435	453	462	488	61
		S.D.	11	15	18	15	19	14
Female	0	No.	6	6	6	6	6	6
		Mean	245	252	257	259	266	21
		S.D.	27	31	28	32	30	10
	60	No.	6	6	6	6	6	6
		Mean	263	265	272	276	285	21
		S.D.	29	26	27	32	34	6
	250	No.	6	6	6	6	6	6
		Mean	238	246	245	256	261	23
		S.D.	19	20	20	18	22	4

Unit : g

No significant difference in any treated groups from control group.

Table 3-1 Food consumption of rats administered orally with 4,4'-Thiobis (6-tert-butyl-m-cresol) for 28 days

Sex	Dose mg/kg		Day of administration								
			1	4	8	11	15	18	22	25	29
Male	0	No.	12	12	12	12	12	12	12	12	12
		Mean	25.3	26.4	28.6	30.0	32.8	31.7	32.8	31.7	32.1
		S.D.	1.5	1.8	1.9	2.4	2.4	2.6	2.8	3.9	3.3
	15	No.	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		Mean	25.8	27.1	30.0	30.4	32.2	31.2	33.3	31.1	32.9
		S.D.	1.2	1.5	1.9	3.1	3.2	3.6	3.0	3.4	3.3
	60	No.	12	12	12	12	12	12	12	12	12
		Mean	26.8	28.0	30.8	31.9	34.9	33.2	35.6	33.3	35.4*
		S.D.	2.0	1.5	2.5	3.0	3.9	4.2	3.9	3.3	3.2
	250	No.	12	12	12	12	12	12	12	12	12
		Mean	26.0	22.5**	29.4	31.3	34.7	32.9	36.5*	34.2	35.8*
		S.D.	1.9	2.9	2.0	2.1	1.4	2.0	3.1	2.5	2.6
Female	0	No.	12	12	12	12	12	12	12	12	12
		Mean	19.0	18.7	20.2	20.5	21.5	21.4	22.8	22.0	22.8
		S.D.	1.5	1.1	1.6	2.3	2.3	2.6	2.8	2.0	3.1
	15	No.	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		Mean	18.2	20.7	21.1	21.4	22.8	22.6	24.9	22.6	24.3
		S.D.	1.3	2.1	1.4	2.0	1.2	1.1	2.4	2.1	1.4
	60	No.	12	12	12	12	12	12	12	12	12
		Mean	19.3	20.0	20.8	21.7	22.8	22.6	23.7	22.3	23.8
		S.D.	2.1	1.3	1.7	2.8	2.3	2.1	2.3	2.6	2.7
	250	No.	12	12	12	12	12	12	12	12	12
		Mean	19.3	17.1*	21.5	20.5	22.9	22.3	24.0	23.6	24.0
		S.D.	1.9	2.0	1.4	1.4	2.0	2.2	2.7	2.7	2.9

Unit : g/rat/day

Significantly different from control (*:p<0.05, **:p<0.01)

Table 3-2 Food consumption of rats administered orally with 4,4'-Thiobis (6-tert-butyl-m-cresol) for 28 days and followed by a recovery period for 14 days

Sex	Dose mg/kg		Day of recovery			
			3	7	10	14
Male	0	No.	6	6	6	6
		Mean	34.8	34.2	32.7	35.2
		S.D.	2.8	2.7	2.8	3.4
	50	No.	6	6	6	6
		Mean	32.8	32.2	30.8	32.7
		S.D.	3.3	3.3	2.8	2.6
	250	No.	6	6	6	6
		Mean	35.1	34.6	32.6	35.9
		S.D.	2.7	3.0	2.0	2.7
Female	0	No.	6	6	6	6
		Mean	22.8	21.8	19.8	22.4
		S.D.	3.7	3.0	4.4	2.9
	50	No.	6	6	6	6
		Mean	23.8	23.1	22.6	24.4
		S.D.	4.4	3.6	3.7	2.9
	250	No.	6	6	6	6
		Mean	26.3	23.4	22.4	24.1
		S.D.	4.1	2.2	2.0	2.1

Unit : g/rat/day

No significant difference in any treated groups from control group.

Table 4-1 Urinalysis of rats administered orally with 4,4'-Thiobis (6-tert-butyl-m-cresol) for 28 days

Sex	Dose mg/kg	No.	pH									1) Protein						2) Ketone body						3) Glucose					
			5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	-	+-	+	++	+++	++++	-	+-	+	++	+++	++++	-	+-	+	++	+++	++++
Male	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1	4	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
	15	6	0	0	0	0	0	0	0	4	2	1	3	1	1	0	0	5	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
	60	6	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	3	2	1	0	0	5	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
	250	6	0	0	0	0	0	1	2	1	2	1	1	3	1	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
Female	0	6	0	0	0	0	0	1	2	2	1	5	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
	15	6	0	0	1	0	1	0	2	2	0	4	1	1	0	0	0	5	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
	60	6	0	0	0	3	1	0	1	0	1	2	0	2	2	0	0	3	2	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0
	250	6	0	1	1	1	0	2	0	1	0	1	0	4	1	0	0	2	3	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0
1)	- : 0 - 5 mg/dl		+- : 10 - 20 mg/dl			+ : 30 - 70 mg/dl			++ : 100 - 200 mg/dl			+++ : 250 - 400 mg/dl			++++ : >400 mg/dl														
2)	- : 0 mg/dl		+- : 5 mg/dl			+ : 10 - 20 mg/dl			++ : 30 - 45 mg/dl			+++ : 60 - 80 mg/dl			++++ : >80 mg/dl														
3)	- : 0 - 10 mg/dl		+- : 30 - 50 mg/dl			+ : 70 - 100 mg/dl			++ : 150 - 200 mg/dl			+++ : 300 - 500 mg/dl			++++ : ≥1000 mg/dl														

Table 4-2 Urinalysis of rats administered orally with 4,4'-Thiobis (6-tert-butyl-m-cresol) for 28 days

Sex	Dose mg/kg	No.	4) Occult blood					5) Bilirubin						6) Urobilinogen					7) Color		
			-	+-	+	++	+++	-	+-	+	++	+++	++++	+-	+	++	+++	++++	LY	Y	DY
Male	0	6	4	1	1	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0
	15	6	5	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0
	60	6	5	0	0	1	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0
	250	6	5	0	0	0	1	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	5	1
Female	0	6	5	0	1	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0
	15	6	5	0	1	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0
	60	6	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0
	250	6	4	1	0	0	1	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	4	2
4)	- : 0 mg/dl		+- : 0.03 mg/dl					+ : 0.06 - 0.1 mg/dl						++ : 0.2 - 0.5 mg/dl					+++ : ≥ 1.0 mg/dl		
5)	- : 0 mg/dl		+- : 0.2 mg/dl					+ : 0.5 - 1.0 mg/dl						++ : 2.0 - 4.0 mg/dl					+++ : 6.0 - 10.0 mg/dl		
6)	+- : 0.2 - 1.0 mg/dl		+ : 2.0 - 3.0 mg/dl					++ : 4.0 - 6.0 mg/dl						+++ : 8.0 - 12.0 mg/dl					++++ : > 10.0 mg/dl		
7)	LY : Light yellow		Y : Yellow					DY : Dark yellow													

Table 4-3

Urinalysis of rats administered orally with 4,4'-Thiobis (6-tert-butyl-m-cresol) for 28 days

Sex	Dose mg/kg	No.	URINE SEDIMENT																																
			RBC					WBC					SEC					SREC					Cast			CRYSTALLIZATION									
																										PS					CO				
			-	+-	+	++	+++	-	+-	+	++	+++	-	+-	+	++	+++	-	+-	+	++	+++	-	+-	+	-	+-	+	++	+++					
Male	0	6	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	
	15	6	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	4	2	0	0	0	0	6	0	0	0	0	
	60	6	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	5	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	
	250	6	5	0	0	1	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	3	2	1	0	0	0	6	0	0	0	0	
Female	0	6	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	
	15	6	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	5	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	
	60	6	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	6	0	0	4	2	0	0	0	0	6	0	0	0	0	
	250	6	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	3	3	0	0	0	0	6	0	0	0	0	

SEC : Squamous Epithelial Cell
 SREC : Small Round Epithelial Cell
 PS : Phosphate Salts
 CO : Calcium Oxalate

- : Negative
 +- : Slight
 + : Mild
 ++ : Moderate
 +++ : Severe

Table 4-4 Urinalysis of rats administered orally with 4,4'-Thiobis (6-tert-butyl-m-cresol) for 28 days

Sex	Dose mg/kg	No.		Water intake ml/rat/24hrs	Urine volume ml/24hrs	S.G.
Male	0	6	Mean	40	9.9	1.072
			S.D.	8	3.6	0.012
	15	6	Mean	41	9.3	1.073
			S.D.	6	5.3	0.018
	60	6	Mean	45	12.9	1.063
			S.D.	4	5.4	0.015
	250	6	Mean	51	13.5	1.058
			S.D.	12	5.0	0.011
Female	0	6	Mean	35	8.4	1.070
			S.D.	7	3.0	0.018
	15	6	Mean	41	10.2	1.060
			S.D.	8	7.1	0.016
	60	6	Mean	39	4.8	1.079
			S.D.	25	2.4	0.018
	250	6	Mean	41	5.6	1.066
			S.D.	12	3.7	0.026

No significant difference in any treated groups from control group.

Table 4-5

Urinalysis of rats administered orally with 4,4'-Thiobis (6-tert-butyl-m-cresol) for 28 days
and followed by a recovery period for 14 days

Sex	Dose mg/kg	No.	pH									1) Protein						2) Ketone body						3) Glucose					
			5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	-	+-	+	++	+++	++++	-	+-	+	++	+++	++++	-	+-	+	++	+++	++++
Male	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	3	3	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
	60	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	5	0	0	0	5	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
	250	6	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	2	1	3	0	0	4	1	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0
Female	0	6	0	0	0	0	0	1	0	3	2	3	1	1	1	0	0	5	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
	60	6	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	4	0	2	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
	250	6	0	0	0	1	1	1	1	2	0	1	3	2	0	0	0	5	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
1)	- : 0 - 5 mg/dl		+- : 10 - 20 mg/dl			+ : 30 - 70 mg/dl			++ : 100 - 200 mg/dl			+++ : 250 - 400 mg/dl			++++ : >400 mg/dl														
2)	- : 0 mg/dl		+- : 5 mg/dl			+ : 10 - 20 mg/dl			++ : 30 - 45 mg/dl			+++ : 60 - 80 mg/dl			++++ : >80 mg/dl														
3)	- : 0 - 10 mg/dl		+- : 30 - 50 mg/dl			+ : 70 - 100 mg/dl			++ : 150 - 200 mg/dl			+++ : 300 - 500 mg/dl			++++ : ≥1000 mg/dl														

Table 4-6

Urinalysis of rats administered orally with 4,4'-Thiobis (6-tert-butyl-m-cresol) for 28 days
and followed by a recovery period for 14 days

Sex	Dose mg/kg	No.	4) Occult blood					5) Bilirubin						6) Urobilinogen					7) Color		
			-	+-	+	++	+++	-	+-	+	++	+++	++++	+-	+	++	+++	++++	LY	Y	DY
Male	0	6	3	1	1	1	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0
	60	6	4	1	1	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0
	250	6	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	6	0
Female	0	6	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	6	0
	60	6	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0
	250	6	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0
4) - : 0 mg/dl			+- : 0.03 mg/dl					+ : 0.06 - 0.1 mg/dl						++ : 0.2 - 0.5 mg/dl					+++ : ≥1.0 mg/dl		
5) - : 0 mg/dl			+- : 0.2 mg/dl					+ : 0.5 - 1.0 mg/dl						++ : 2.0 - 4.0 mg/dl					+++ : 6.0 - 10.0 mg/dl		
6) +- : 0.2 - 1.0 mg/dl			+ : 2.0 - 3.0 mg/dl					++ : 4.0 - 6.0 mg/dl						+++ : 8.0 - 12.0 mg/dl					++++ : >10.0 mg/dl		
7) LY : Light yellow			Y : Yellow					DY : Dark yellow													

Table 4-7

Urinalysis of rats administered orally with 4,4'-Thiobis (6-tert-butyl-m-cresol) for 28 days and followed by a recovery period for 14 days

Sex	Dose mg/kg	No.	URINE SEDIMENT																				CRYSTALLIZATION												
			RBC					WBC					SEC					SREC					Cast			PS					CO				
			-	+-	+	++	+++	-	+-	+	++	+++	-	+-	+	++	+++	-	+-	+	++	+++	-	+-	+	-	+-	+	++	+++	-	+-	+	++	+++
Male	0	6	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	3	3	0	0	0	6	0	0	0	0		
	60	6	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	4	2	0	0	0	6	0	0	0	0		
	250	6	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	4	2	0	0	0	6	0	0	0	0		
Female	0	6	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	1	5	0	0	0	6	0	0	0	0		
	60	6	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	3	3	0	0	0	6	0	0	0	0		
	250	6	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	1	4	1	0	0	6	0	0	0	0		
SEC : Squamous Epithelial Cell			-					:					Negative																						
SREC : Small Round Epithelial Cell			+-					:					Slight																						
PS : Phosphate Salts			+					:					Mild																						
CO : Calcium Oxalate			++					:					Moderate																						
			+++					:					Severe																						

Table 4-8

Urinalysis of rats administered orally with 4,4'-Thiobis (6-tert-butyl-m-cresol) for 28 days
and followed by a recovery period for 14 days

Sex	Dose mg/kg	No.		Water intake ml/rat/24hrs	Urine volume ml/24hrs	S.G.
Male	0	6	Mean	44	10.4	1.079
			S.D.	5	3.3	0.019
	60	6	Mean	41	9.2	1.074
			S.D.	8	6.5	0.017
	250	6	Mean	42	8.9	1.078
			S.D.	4	6.0	0.019
Female	0	6	Mean	30	6.1	1.068
			S.D.	7	3.2	0.013
	60	6	Mean	31	7.2	1.066
			S.D.	8	3.6	0.018
	250	6	Mean	42	6.6	1.072
			S.D.	12	4.1	0.023

No significant difference in any treated groups from control group.

Table 5-1 Hematological findings of rats administered orally with 4,4'-Thiobis (6-tert-butyl-m-cresol) for 28 days

Sex	Dose mg/kg	No.		RBC $\times 10^4/\text{mm}^3$	Hb g/dl	Ht %	MCV μ^3	MCH pg	MCHC %	Reticu- loocyte %	Plate- let $\times 10^4/\text{mm}^3$	PT sec.	APTT sec.
Male	0	6	Mean	800	16.0	48	59.8	20.0	33.5	20	118.0	12.8	19.4
			S.D.	38	0.4	2	1.9	0.7	0.4	3	7.3	1.1	1.8
	15	6	Mean	791	15.9	48	60.4	20.1	33.2	22	122.2	11.8	18.0
			S.D.	28	0.4	1	0.6	0.5	0.6	3	8.1	0.8	1.2
	60	6	Mean	790	15.6	47	59.8	19.8	33.2	21	116.5	11.4*	17.3
			S.D.	38	0.4	2	2.1	0.7	0.4	3	11.9	0.5	1.4
	250	6	Mean	793	15.9	48	60.0	20.0	33.3	22	135.0*	13.6	21.3
			S.D.	27	0.7	2	0.9	0.3	0.4	6	9.2	1.3	1.8
	0	6	Mean	753	15.5	45	59.2	20.6	34.8	22	114.6	10.6	14.0
			S.D.	35	0.5	2	1.4	0.6	0.9	4	8.7	0.5	0.9
	15	6	Mean	760	16.1	45	59.8	21.2	35.4	17	120.6	10.9	13.7
			S.D.	36	0.6	2	1.2	0.5	0.4	5	11.6	0.3	0.5
Female	60	6	Mean	724	15.3	43	59.5	21.2	35.6	19	116.2	10.5	14.1
			S.D.	26	0.4	1	1.2	0.5	0.4	3	6.3	0.7	1.4
	250	6	Mean	758	15.8	44	58.5	20.8	35.5	19	136.6**	10.0	14.3
			S.D.	49	0.8	2	1.0	0.4	0.2	4	9.2	0.3	1.6

Significantly different from control (*:p<0.05, **:p<0.01)

Table 5-2

Hematological findings of rats administered orally with 4,4'-Thiobis (6-tert-butyl-m-cresol) for 28 days

Sex	Dose mg/kg	No.		WBC	Differential leukocyte counts (%)						
				$\times 10^2/\text{mm}^3$	Lymph.	Stab	Seg.	Eosino.	Baso.	Mono.	Others
Male	0	6	Mean	95	84.5	0.1	14.8	0.4	0.0	0.2	0.0
			S.D.	34	5.5	0.2	5.6	0.6	0.0	0.3	0.0
	15	6	Mean	105	88.3	0.1	10.7	0.9	0.0	0.1	0.0
			S.D.	39	4.1	0.2	4.7	0.8	0.0	0.2	0.0
	60	6	Mean	96	81.1	0.2	17.8	0.8	0.0	0.1	0.0
			S.D.	28	2.2	0.3	1.9	1.0	0.0	0.2	0.0
	250	6	Mean	97	87.8	0.3	11.5	0.3	0.0	0.3	0.0
			S.D.	37	3.6	0.3	3.4	0.4	0.0	0.3	0.0
	0	6	Mean	66	86.0	0.0	13.2	0.7	0.0	0.2	0.0
			S.D.	10	3.1	0.0	3.2	0.3	0.0	0.3	0.0
	15	6	Mean	76	84.3	0.2	14.1	1.2	0.0	0.3	0.0
			S.D.	18	3.2	0.3	2.4	0.9	0.0	0.3	0.0
Female	60	6	Mean	86	83.2	0.2	15.4	1.2	0.0	0.1	0.0
			S.D.	23	6.8	0.3	6.3	0.7	0.0	0.2	0.0
	250	6	Mean	93	73.0**	0.3	24.4**	1.9	0.0	0.3	0.0
			S.D.	37	9.0	0.4	7.7	1.3	0.0	0.4	0.0

Significantly different from control (**:p<0.01)

Table 5-3

Hematological findings of rats administered orally with 4,4'-Thiobis (6-tert-butyl-m-cresol) for 28 days and followed by a recovery period for 14 days

Sex	Dose mg/kg	No.		RBC X10 ⁴ /mm ³	Hb g/dl	Ht %	MCV μ ³	MCH pg	MCHC %	Reticu- locyte %	Plate- let X10 ⁴ /mm ³	PT sec.	APTT sec.
Male	0	6	Mean	806	15.8	47	58.1	19.6	33.8	21	107.4	12.3	19.8
			S.D.	21	0.4	1	1.0	0.2	0.4	5	3.6	1.5	2.4
	60	6	Mean	812	15.9	47	58.1	19.6	33.8	20	109.3	12.5	19.0
			S.D.	28	0.3	1	2.4	0.8	0.4	4	7.4	1.1	1.4
	250	6	Mean	801	15.4	46	57.6	19.3	33.4	23	118.8*	12.1	18.9
			S.D.	15	0.4	1	2.5	0.8	0.3	4	9.2	0.8	1.8
Female	0	6	Mean	812	15.6	46	56.8	19.2	33.9	20	113.3	10.7	16.6
			S.D.	46	0.3	1	2.3	0.9	0.4	2	10.8	0.5	1.4
	60	6	Mean	810	15.8	47	57.3	19.4	33.9	23	112.4	10.5	16.3
			S.D.	27	0.5	2	0.5	0.2	0.4	5	8.3	0.6	1.9
	250	6	Mean	808	15.5	46	57.1	19.2	33.6	22	128.1*	10.8	16.4
			S.D.	19	0.2	1	0.8	0.4	0.3	5	7.2	0.3	1.2

Significantly different from control (*:p<0.05)

Table 5-4

Hematological findings of rats administered orally with 4,4'-Thiobis (6-tert-butyl-m-cresol) for 28 days and followed by a recovery period for 14 days

Sex	Dose mg/kg	No.		WBC	Differential leukocyte counts (%)							
				$\times 10^2/\text{mm}^3$	Lymph.	Stab	Seg.	Eosino.	Baso.	Mono.	Others	
Male	0	6	Mean	92	79.9	0.2	18.7	0.9	0.0	0.3	0.0	
			S.D.	18	9.2	0.3	8.6	0.4	0.0	0.4	0.0	
	60	6	Mean	99	84.0	0.1	14.9	0.6	0.0	0.4	0.0	
			S.D.	24	4.8	0.2	4.3	0.5	0.0	0.4	0.0	
	250	6	Mean	97	80.3	0.0	18.7	0.7	0.0	0.3	0.0	
			S.D.	8	8.9	0.0	9.0	0.6	0.0	0.4	0.0	
	Female	0	6	Mean	84	79.2	0.2	19.6	0.8	0.0	0.3	0.0
				S.D.	32	9.0	0.3	8.8	0.6	0.0	0.3	0.0
		60	6	Mean	100	88.6	0.3	9.9	1.0	0.0	0.2	0.0
S.D.				23	2.2	0.4	1.7	0.8	0.0	0.3	0.0	
250		6	Mean	80	85.4	0.3	13.3	0.8	0.0	0.3	0.0	
			S.D.	26	8.0	0.3	7.9	0.5	0.0	0.3	0.0	

No significant difference in any treated groups from control group.

Table 6-1 Blood chemical findings of rats administered orally with 4,4'-Thiobis (6-tert-butyl-m-cresol) for 28 days

Sex	Dose mg/kg	No.		GOT IU/l	GPT IU/l	LDH IU/l	ALP IU/l	γ -GTP IU/l	ChE IU/l	TP g/dl	Albumin g/dl	A/G	T.cho mg/dl
Male	0	6	Mean	54	36	26	289	1.5	672	6.0	3.5	1.39	59
			S.D.	9	6	5	61	0.7	39	0.2	0.1	0.12	13
	15	6	Mean	57	34	25	297	1.4	707	6.0	3.4	1.32	62
			S.D.	10	4	3	38	0.5	92	0.2	0.1	0.09	12
	60	6	Mean	53	35	24	312	1.5	690	5.8	3.4	1.41	62
			S.D.	5	5	6	65	0.3	74	0.2	0.1	0.09	15
	250	6	Mean	60	36	27	326	1.5	787	5.7	3.3	1.41	81*
			S.D.	5	9	8	69	0.4	95	0.3	0.1	0.13	9
Female	0	6	Mean	63	36	24	192	1.7	2610	6.4	3.7	1.36	70
			S.D.	10	7	17	34	0.7	663	0.5	0.2	0.10	14
	15	6	Mean	59	33	20	185	1.9	2268	6.2	3.7	1.48	68
			S.D.	8	3	6	26	0.7	695	0.3	0.2	0.10	8
	60	6	Mean	64	35	22	198	1.5	1857	6.1	3.5	1.35	84
			S.D.	4	3	7	71	0.4	508	0.3	0.2	0.10	16
	250	6	Mean	57	37	26	186	1.4	1832	6.5	3.7	1.30	101**
			S.D.	8	9	6	25	0.8	592	0.4	0.3	0.08	15

Significantly different from control (*:p<0.05, **:p<0.01)

Table 6-2

Blood chemical findings of rats administered orally with 4,4'-Thiobis (6-tert-butyl-m-cresol) for 28 days

Sex	Dose mg/kg	No.		TG mg/dl	PL mg/dl	T.bili- rubin mg/dl	Glucose mg/dl	BUN mg/dl	Crea- tinine mg/dl	Na mEq/l	K mEq/l	Cl mEq/l	Ca mg/dl	P mg/dl
Male	0	6	Mean	74	113	0.11	119	12	0.57	142	4.8	110	9.3	9.2
			S.D.	23	22	0.01	22	1	0.03	1	0.4	1	0.2	0.5
	15	6	Mean	94	114	0.11	118	12	0.58	142	4.6	110	9.2	9.2
			S.D.	20	15	0.01	8	1	0.03	1	0.3	1	0.2	0.5
	60	6	Mean	97	122	0.12	124	13	0.58	142	4.4	110	9.2	9.2
			S.D.	22	22	0.02	10	2	0.02	1	0.3	1	0.3	0.5
	250	6	Mean	77	132	0.16	106	13	0.56	142	4.6	110	9.3	9.8
			S.D.	33	11	0.07	11	1	0.03	1	0.2	1	0.3	0.2
Female	0	6	Mean	32	133	0.11	107	14	0.60	141	4.8	112	9.0	8.2
			S.D.	4	24	0.01	12	2	0.06	1	0.4	2	0.1	0.7
	15	6	Mean	37	134	0.12	104	15	0.60	141	5.1	111	9.1	8.6
			S.D.	9	15	0.01	9	1	0.06	1	0.2	1	0.2	0.6
	60	6	Mean	36	161	0.11	107	13	0.58	140	5.0	112	8.9	9.2*
			S.D.	5	30	0.01	9	1	0.04	1	0.2	2	0.2	0.5
	250	6	Mean	54	192**	0.48	83**	17*	0.63	140	5.2	114	9.2	9.2*
			S.D.	28	39	0.38	16	3	0.05	2	0.6	2	0.4	0.8

Significantly different from control (*:p<0.05, **:p<0.01)

Table 6-3

Blood chemical findings of rats administered orally with 4,4'-Thiobis (6-tert-butyl-m-cresol) for 28 days and followed by a recovery period for 14 days

Sex	Dose mg/kg	No.		GOT IU/l	GPT IU/l	LDH IU/l	ALP IU/l	γ -GTP IU/l	ChE IU/l	TP g/dl	Albumin g/dl	A/G	T.cho mg/dl
Male	0	6	Mean	56	41	33	232	1.7	693	6.3	3.4	1.19	66
			S.D.	11	4	9	67	0.2	89	0.1	0.1	0.08	15
	60	6	Mean	57	36	25	247	1.7	802	6.2	3.4	1.24	65
			S.D.	16	8	6	56	0.3	229	0.2	0.2	0.13	14
	250	6	Mean	61	33	28	244	1.8	650	6.2	3.4	1.22	67
			S.D.	17	5	12	25	0.2	52	0.2	0.1	0.10	14
Female	0	6	Mean	64	34	23	142	1.8	2410	6.7	3.6	1.18	62
			S.D.	5	5	6	36	0.4	703	0.2	0.2	0.09	12
	60	6	Mean	69	35	24	147	1.8	2665	7.1	3.7	1.12	88*
			S.D.	7	8	5	32	0.6	927	0.4	0.1	0.10	18
	250	6	Mean	66	31	27	131	1.3	2275	6.9	3.7	1.12	63
			S.D.	11	4	10	30	0.6	473	0.3	0.2	0.08	15

Significantly different from control (*:p<0.05)

Table 6-4

Blood chemical findings of rats administered orally with 4,4'-Thiobis (6-tert-butyl-m-cresol) for 28 days and followed by a recovery period for 14 days

Sex	Dose mg/kg	No.		TG mg/dl	PL mg/dl	T.bili- rubin mg/dl	Glucose mg/dl	BUN mg/dl	Crea- tinine mg/dl	Na mEq/l	K mEq/l	Cl mEq/l	Ca mg/dl	P mg/dl
Male	0	6	Mean	113	125	0.13	139	14	0.56	145	4.8	111	9.0	7.8
			S.D.	36	21	0.02	15	2	0.05	1	0.3	1	0.2	0.5
	60	6	Mean	110	125	0.13	127	13	0.60	145	4.7	112	8.9	7.8
			S.D.	54	26	0.02	11	1	0.05	1	0.3	1	0.1	0.4
	250	6	Mean	88	123	0.12	122*	16	0.62	145	4.7	111	9.0	8.4
			S.D.	38	18	0.01	4	2	0.06	1	0.3	2	0.2	0.4
Female	0	6	Mean	39	138	0.13	108	15	0.59	142	5.1	114	9.2	8.2
			S.D.	10	23	0.02	14	2	0.04	1	0.3	1	0.3	0.3
	60	6	Mean	42	178*	0.13	120	14	0.61	142	5.1	114	9.2	7.9
			S.D.	7	20	0.02	18	2	0.08	0	0.3	1	0.2	0.7
	250	6	Mean	36	136	0.14	105	15	0.60	142	5.2	114	9.1	8.3
			S.D.	14	30	0.02	8	2	0.05	1	0.3	1	0.2	1.0

Significantly different from control (*:p<0.05)

Table 7-1

Gross pathological findings of rats administered orally with 4,4'-Thiobis (6-tert-butyl-m-cresol) for 28 days

Sex	Organs Findings	Dose (mg/kg)	0	15	60	250
		No. of animals	6	6	6	6
Male	Small intestine					
	Thickening of wall		0	0	0	4
	Large intestine					
	Dilatation of cecum		0	0	0	5
Female	Thyroid					
	Enlargement (bilateral)		0	1	0	0
	Small intestine					
	Thickening of wall		0	0	0	4
	Large intestine					
	Dilatation of cecum		0	0	0	4

Table 7-2

Gross pathological findings of rats administered orally with 4,4'-Thiobis (6-tert-butyl-m-cresol) for 28 days and followed by a recovery period for 14 days

Sex	Organs Findings	Dose (mg/kg)	0	60	250
		No. of animals	6	6	6
Male	Testis				
	Enlargement (unilateral)		0	1	0
	Epididymis				
	Yellow nodule (unilateral)		0	0	1

No lesions were found in females.

Table 8-1

Absolute and relative organ weights of male rats administered orally with 4,4'-Thiobis (6-tert-butyl-m-cresol) for 28 days

	Dose mg/kg		Body weight g	Brain g/g%	Thymus mg/mg%	Heart g/g%	Lung g/g%	Liver g/g%	Spleen g/g%	Kidney (R) g/g%	Kidney (L) g/g%	Kidney (R+L) g/g%
Absolute	0	No.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		Mean	375	2.01	535	1.27	1.29	11.65	0.69	1.45	1.43	2.87
		S.D.	19	0.07	74	0.10	0.03	1.08	0.07	0.10	0.12	0.22
	15	No.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		Mean	401	2.04	647	1.32	1.33	12.63	0.72	1.49	1.47	2.96
		S.D.	26	0.05	105	0.11	0.12	1.30	0.12	0.14	0.11	0.25
	60	No.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		Mean	415	2.03	553	1.32	1.39	13.07	0.70	1.48	1.54	3.02
		S.D.	42	0.05	77	0.09	0.11	1.94	0.11	0.13	0.14	0.27
	250	No.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		Mean	378	2.00	464	1.31	1.35	13.78	0.73	1.49	1.49	2.98
		S.D.	18	0.03	76	0.20	0.07	1.64	0.04	0.12	0.15	0.27
Relative	0	No.		6	6	6	6	6	6	6	6	6
		Mean		0.54	143	0.34	0.35	3.10	0.18	0.39	0.38	0.77
		S.D.		0.03	19	0.02	0.02	0.14	0.02	0.01	0.02	0.03
	15	No.		6	6	6	6	6	6	6	6	6
		Mean		0.51	162	0.33	0.33	3.15	0.18	0.37	0.37	0.74
		S.D.		0.03	26	0.02	0.01	0.13	0.02	0.03	0.03	0.05
	60	No.		6	6	6	6	6	6	6	6	6
		Mean		0.49	134	0.32	0.33	3.14	0.17	0.36	0.37	0.73
		S.D.		0.05	19	0.03	0.02	0.22	0.03	0.02	0.02	0.03
	250	No.		6	6	6	6	6	6	6	6	6
		Mean		0.53	123	0.35	0.36	3.64**	0.19	0.40	0.39	0.79
		S.D.		0.02	20	0.05	0.01	0.33	0.02	0.03	0.04	0.07

Significantly different from control (**:p<0.01)

Table 8-2

Absolute and relative organ weights of male rats administered orally with 4,4'-Thiobis (6-tert-butyl-m-cresol) for 28 days

Dose mg/kg			Adrenal (R) mg/mg%	Adrenal (L) mg/mg%	Adrenal (R+L) mg/mg%	Testis (R) g/g%	Testis (L) g/g%	Testis (R+L) g/g%
Absolute	0	No.	6	6	6	6	6	6
		Mean	29	32	60	1.58	1.57	3.15
		S.D.	3	5	8	0.08	0.11	0.19
	15	No.	6	6	6	6	6	6
		Mean	32	34	67	1.68	1.67	3.35
		S.D.	5	5	11	0.10	0.09	0.18
	60	No.	6	6	6	6	6	6
		Mean	30	33	63	1.64	1.63	3.27
		S.D.	4	2	6	0.17	0.13	0.29
	250	No.	6	6	6	6	6	6
		Mean	30	31	61	1.64	1.65	3.29
		S.D.	4	5	9	0.14	0.14	0.28
Relative	0	No.	6	6	6	6	6	6
		Mean	8	9	16	0.42	0.42	0.84
		S.D.	1	1	2	0.02	0.02	0.05
	15	No.	6	6	6	6	6	6
		Mean	8	9	17	0.42	0.42	0.84
		S.D.	2	2	3	0.03	0.03	0.06
	60	No.	6	6	6	6	6	6
		Mean	7	8	15	0.40	0.40	0.80
		S.D.	1	1	2	0.07	0.06	0.13
	250	No.	6	6	6	6	6	6
		Mean	8	8	16	0.44	0.44	0.87
		S.D.	1	1	2	0.04	0.04	0.09

No significant difference in any treated groups from control group.

Table 8-3

Absolute and relative organ weights of female rats administered orally with 4,4'-Thiobis (6-tert-butyl-m-cresol) for 28 days

		Dose mg/kg	Body weight g	Brain g/g%	Thymus mg/mg%	Heart g/g%	Lung g/g%	Liver g/g%	Spleen g/g%	Kidney (R) g/g%	Kidney (L) g/g%	Kidney (R+L) g/g%
Absolute	0	No.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		Mean	228	1.84	420	0.85	1.09	6.75	0.51	0.86	0.86	1.72
		S.D.	12	0.06	108	0.08	0.05	0.76	0.06	0.10	0.11	0.21
	15	No.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		Mean	243	1.86	447	0.84	1.07	6.86	0.49	0.94	0.92	1.86
		S.D.	15	0.05	68	0.05	0.10	0.34	0.03	0.07	0.05	0.11
	60	No.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		Mean	227	1.84	434	0.83	1.06	6.87	0.47	0.92	0.92	1.84
		S.D.	8	0.07	87	0.04	0.08	0.58	0.04	0.08	0.06	0.13
	250	No.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		Mean	220	1.86	460	0.78	1.04	7.65	0.50	0.87	0.87	1.74
		S.D.	12	0.06	97	0.04	0.07	0.86	0.05	0.06	0.08	0.14
Relative	0	No.		6	6	6	6	6	6	6	6	6
		Mean		0.81	184	0.37	0.48	2.96	0.23	0.38	0.38	0.76
		S.D.		0.04	42	0.03	0.02	0.26	0.04	0.04	0.04	0.07
	15	No.		6	6	6	6	6	6	6	6	6
		Mean		0.77	185	0.35	0.44	2.83	0.20	0.39	0.38	0.77
		S.D.		0.04	33	0.02	0.03	0.12	0.02	0.03	0.02	0.05
	60	No.		6	6	6	6	6	6	6	6	6
		Mean		0.81	192	0.37	0.47	3.02	0.21	0.41	0.41	0.81
		S.D.		0.04	41	0.02	0.04	0.19	0.01	0.03	0.02	0.04
	250	No.		6	6	6	6	6	6	6	6	6
		Mean		0.85	210	0.36	0.47	3.46**	0.23	0.40	0.39	0.79
		S.D.		0.04	49	0.01	0.04	0.20	0.03	0.02	0.02	0.05

Significantly different from control (**:p<0.01)

Table 8-4

Absolute and relative organ weights of female rats administered orally with 4,4'-Thiobis (6-tert-butyl-m-cresol) for 28 days

			Adrenal (R) mg/mg%	Adrenal (L) mg/mg%	Adrenal (R+L) mg/mg%	Ovary (R) mg/mg%	Ovary (L) mg/mg%	Ovary (R+L) mg/mg%
Absolute	0	No.	6	6	6	6	6	6
		Mean	35	37	72	40.2	41.1	81.3
		S.D.	4	4	8	3.9	7.1	9.8
	15	No.	6	6	6	6	6	6
		Mean	36	39	75	49.0	47.6	96.6
		S.D.	5	4	8	8.7	7.4	14.9
	60	No.	6	6	6	6	6	6
		Mean	35	41	76	48.7	49.3	98.0
		S.D.	4	6	10	6.3	10.0	15.5
	250	No.	6	6	6	6	6	6
		Mean	35	38	74	52.2*	45.2	97.4
		S.D.	3	2	5	7.5	4.5	10.2
Relative	0	No.	6	6	6	6	6	6
		Mean	15	16	32	17.7	18.0	35.7
		S.D.	2	2	3	2.2	2.8	4.3
	15	No.	6	6	6	6	6	6
		Mean	15	16	31	20.2	19.7	40.0
		S.D.	2	2	4	3.4	3.5	6.2
	60	No.	6	6	6	6	6	6
		Mean	16	18	33	21.5	21.8	43.3
		S.D.	2	3	5	3.2	4.7	7.6
	250	No.	6	6	6	6	6	6
		Mean	16	18	34	23.8**	20.5	44.3
		S.D.	1	1	3	3.8	1.4	4.7

Significantly different from control (*:p<0.05, **:p<0.01)

Table 8-5

Absolute and relative organ weights of male rats administered orally with 4,4'-Thiobis (6-tert-butyl-m-cresol) for 28 days and followed by a recovery period for 14 days

	Dose mg/kg		Body weight g	Brain g/g%	Thymus mg/mg%	Heart g/g%	Lung g/g%	Liver g/g%	Spleen g/g%	Kidney (R) g/g%	Kidney (L) g/g%	Kidney (R+L) g/g%
Absolute	0	No.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		Mean	475	2.10	468	1.43	1.47	14.63	0.80	1.58	1.66	3.24
		S.D.	35	0.04	78	0.09	0.09	1.59	0.13	0.11	0.10	0.20
	60	No.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		Mean	447	2.11	475	1.41	1.46	13.43	0.73	1.52	1.57	3.09
		S.D.	40	0.12	136	0.11	0.11	1.26	0.15	0.13	0.13	0.26
	250	No.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		Mean	455	2.12	489	1.44	1.50	14.67	0.74	1.62	1.63	3.25
		S.D.	17	0.05	52	0.07	0.09	0.85	0.12	0.10	0.11	0.18
Relative	0	No.		6	6	6	6	6	6	6	6	6
		Mean		0.44	99	0.30	0.31	3.07	0.17	0.34	0.35	0.69
		S.D.		0.03	19	0.01	0.01	0.16	0.02	0.02	0.02	0.04
	60	No.		6	6	6	6	6	6	6	6	6
		Mean		0.47	107	0.32*	0.33	3.02	0.16	0.34	0.35	0.69
		S.D.		0.05	29	0.01	0.02	0.31	0.02	0.03	0.03	0.06
	250	No.		6	6	6	6	6	6	6	6	6
		Mean		0.47	108	0.32*	0.33	3.23	0.16	0.35	0.36	0.72
		S.D.		0.02	11	0.01	0.01	0.15	0.02	0.02	0.02	0.04

Significantly different from control (*:p<0.05)

Table 8-6

Absolute and relative organ weights of male rats administered orally with 4,4'-Thiobis (6-tert-butyl-m-cresol) for 28 days and followed by a recovery period for 14 days

			Adrenal (R) mg/mg%	Adrenal (L) mg/mg%	Adrenal (R+L) mg/mg%	Testis (R) g/g%	Testis (L) g/g%	Testis (R+L) g/g%
Absolute	0	No.	6	6	6	6	6	6
		Mean	32	33	64	1.68	1.68	3.36
		S.D.	3	4	7	0.12	0.13	0.24
	60	No.	6	6	6	6	6	6
		Mean	32	34	66	1.86	1.61	3.47
		S.D.	3	4	5	0.57	0.12	0.61
	250	No.	6	6	6	6	6	6
		Mean	32	33	65	1.63	1.59	3.22
		S.D.	5	5	10	0.06	0.06	0.11
Relative	0	No.	6	6	6	6	6	6
		Mean	7	7	14	0.36	0.36	0.71
		S.D.	1	1	2	0.04	0.04	0.08
	60	No.	6	6	6	6	6	6
		Mean	7	8	15	0.42	0.36	0.78
		S.D.	1	1	2	0.13	0.03	0.14
	250	No.	6	6	6	6	6	6
		Mean	7	8	14	0.36	0.35	0.71
		S.D.	1	1	3	0.02	0.02	0.05

No significant difference in any treated groups from control group.

Table 8-7

Absolute and relative organ weights of female rats administered orally with 4,4'-Thiobis (6-tert-butyl-m-cresol) for 28 days and followed by a recovery period for 14 days

	Dose mg/kg		Body weight g	Brain g/g%	Thymus mg/mg%	Heart g/g%	Lung g/g%	Liver g/g%	Spleen g/g%	Kidney (R) g/g%	Kidney (L) g/g%	Kidney (R+L) g/g%
Absolute	0	No.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		Mean	249	1.86	341	0.86	1.08	6.84	0.51	0.90	0.91	1.81
		S.D.	29	0.04	50	0.09	0.08	0.93	0.07	0.07	0.07	0.14
	60	No.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		Mean	264	1.99*	384	0.94	1.11	7.49	0.52	0.96	0.92	1.87
		S.D.	29	0.15	57	0.11	0.09	1.08	0.08	0.13	0.09	0.22
	250	No.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		Mean	238	1.88	339	0.84	1.05	7.00	0.50	0.88	0.87	1.74
		S.D.	17	0.08	85	0.04	0.10	0.65	0.04	0.08	0.09	0.16
Relative	0	No.		6	6	6	6	6	6	6	6	6
		Mean		0.75	138	0.35	0.43	2.75	0.21	0.37	0.37	0.73
		S.D.		0.08	18	0.03	0.03	0.13	0.03	0.03	0.02	0.05
	60	No.		6	6	6	6	6	6	6	6	6
		Mean		0.76	147	0.36	0.42	2.83	0.20	0.36	0.35	0.71
		S.D.		0.09	22	0.02	0.02	0.13	0.03	0.01	0.01	0.01
	250	No.		6	6	6	6	6	6	6	6	6
		Mean		0.80	142	0.36	0.44	2.94	0.21	0.37	0.37	0.74
		S.D.		0.07	34	0.01	0.02	0.12	0.01	0.03	0.03	0.06

Significantly different from control (*:p<0.05)

Table 8-8

Absolute and relative organ weights of female rats administered orally with 4,4'-Thiobis (6-tert-butyl-m-cresol) for 28 days and followed by a recovery period for 14 days

Dose mg/kg			Adrenal (R) mg/mg%	Adrenal (L) mg/mg%	Adrenal (R+L) mg/mg%	Ovary (R) mg/mg%	Ovary (L) mg/mg%	Ovary (R+L) mg/mg%
Absolute	0	No.	6	6	6	6	6	6
		Mean	35	36	70	45.3	43.0	88.3
		S.D.	3	3	6	8.9	7.0	13.0
	60	No.	6	6	6	6	6	6
		Mean	38	39	76	46.5	45.9	92.4
		S.D.	3	3	5	4.3	7.1	9.9
	250	No.	6	6	6	6	6	6
		Mean	38	40	78	45.9	50.1	96.0
		S.D.	5	5	10	8.6	5.2	12.5
Relative	0	No.	6	6	6	6	6	6
		Mean	14	15	28	18.6	17.4	36.0
		S.D.	2	2	3	4.8	2.9	6.8
	60	No.	6	6	6	6	6	6
		Mean	15	15	29	17.7	17.4	35.1
		S.D.	2	1	3	1.0	1.7	1.4
	250	No.	6	6	6	6	6	6
		Mean	16	17	33	19.3	21.1*	40.4
		S.D.	3	3	5	3.2	2.3	4.6

Significantly different from control (*:p<0.05)

Table 9-1

Histopathological findings of male rats administered orally with 4,4'-Thiobis (6-tert-butyl-m-cresol) for 28 days

Organs	Dose (mg/kg)	0						15						60						250									
	No. of animals	6						6						6						6									
-findings	Grade	0	1	2	3	4	P	TE	0	1	2	3	4	P	TE	0	1	2	3	4	P	TE	0	1	2	3	4	P	TE
Ileum																													
-hyperplasia / villus		6							6	6						6	6					6	5	1				6	
Cecum																													
-vacuolization / cytoplasmic / absorptive epithelial cell		6							6	6						6	3	3				6	1	4	1			6	
-cellular infiltration / mucosa		6							6	6						6	1	4	1			6	3	2	1			6	
Colon																													
-vacuolization / cytoplasmic / absorptive epithelial cell		6							6	6						6	5	1				6	5	1				6	
Rectum																													
-cellular infiltration / mucosa		6							6	6						6	6					6	5	1				6	
Liver																													
-hypertrophy / hepatocyte / centrilobular		6							6	6						6	6					6	1	5				6	
-altered hepatocellular foci		6						1	6	6						6	6					6	6					6	
Mesenteric lymph node																													
-tingible body macrophage / paracortical / increased		5	1						6	5	1					6	5	1				6	4	1	1				6
Kidney																													
-basophilic change / proximal tubule / focal		6							6														5	1				6	
Prostate																													
-inflammation		5	1						6														6					6	

0 : No remarkable changes 1 : Slight 2 : Mild 3 : Moderate 4 : Severe P : Present a) TE : Total Examined

a): "Present" is used when grading of severity was not done, such as case in the neoplastic lesion.

Table 9-2

Histopathological findings of female rats administered orally with 4,4'-Thiobis (6-tert-butyl-m-cresol) for 28 days

Organs	Dose (mg/kg)	0						15						60						250									
-findings	No. of animals	6						6						6						5									
	Grade	0	1	2	3	4	P	TE	0	1	2	3	4	P	TE	0	1	2	3	4	P	TE	0	1	2	3	4	P	TE
Ileum																													
-hyperplasia / villus		6							6	6						6	6						6	3	3				6
Cecum																													
-vacuolization / cytoplasmic / absorptive epithelial cell		6							6	6						6	5	1					6	1	3	2			6
-cellular infiltration / mucosa		6							6	6						6	5	1					6	3	2	1			6
Colon																													
-vacuolization / cytoplasmic / absorptive epithelial cell		6							6	6						6	5	1					6	4	2				6
-cellular infiltration / mucosa		6							6	6						6	5	1					6	4	2				6
Rectum																													
-cellular infiltration / mucosa		6							6	6						6	6						6	5	1				6
Liver																													
-hypertrophy / hepatocyte / centrilobular		6							6	6						6	5						6	1	5				6
-microgranuloma		6							6	6						6	5	1					6	6					6
Thyroid (Parathyroid)																													
-hyperplasia / follicle cell / diffuse		6							6			1				1							6						6
Mesenteric lymph node																													
-tingible body macrophage / paracortical / increased		6							6	5	1					6	4	2					6	1	4	1			6

0 : No remarkable changes 1 : Slight 2 : Mild 3 : Moderate 4 : Severe P : Present a) TE : Total Examined
a): "Present" is used when grading of severity was not done, such as case in the neoplastic lesion.

Table 9-3

Histopathological findings of male rats administered orally with 4,4'-Thiobis (6-tert-butyl-m-cresol) for 28 days and followed by a recovery period for 14 days

Organs -findings	Dose (mg/kg) No. of animals Grade	0							60							250						
		0	1	2	3	4	P	TE	0	1	2	3	4	P	TE	0	1	2	3	4	P	TE
Ileum																						
-hyperplasia / villus		6						6	6						6	4	1	1			6	
Cecum																						
-cellular infiltration / mucosa		4	1	1				6	4	2					6	3	2	1			6	
Rectum																						
-cellular infiltration / mucosa		6						6	6						6	5	1				6	
Liver																						
-microgranuloma		5	1					6								5	1				6	

0 : No remarkable changes 1 : Slight 2 : Mild 3 : Moderate 4 : Severe P : Present a) TE : Total Examined
a): "Present" is used when grading of severity was not done, such as case in the neoplastic lesion.

Table 9-4

Histopathological findings of female rats administered orally with 4,4'-Thiobis (6-tert-butyl-m-cresol) for 28 days and followed by a recovery period for 14 days

Organs	Dose (mg/kg)	0						60						250								
	No. of animals	6						6						6								
-findings	Grade	0	1	2	3	4	P	TE	0	1	2	3	4	P	TE	0	1	2	3	4	P	TE
Ileum																						
-hyperplasia / villus		6						6	6						6	4	2					6
Cecum																						
-cellular infiltration / mucosa		4	2					6	5	1					6	2	2	2				6
Rectum																						
-cellular infiltration / mucosa		6						6	5	1					6	6						6
Liver																						
-microgranuloma		5	1					6								6						6

0 : No remarkable changes 1 : Slight 2 : Mild 3 : Moderate 4 : Severe P : Present a) TE : Total Examined
a): "Present" is used when grading of severity was not done, such as case in the neoplastic lesion.

Table 9-5

Histopathological findings of rats administered orally with 4,4'-Thiobis (6-tert-butyl-m-cresol) for 28 days and followed by a recovery period for 14 days (Gross lesions)

Sex	Dose mg/kg	Animal number	Organs	Gross pathological findings	Histopathological findings (grade)*
Male	60	3010	Testis	-Enlargement (unilateral)	-Atrophy / tubular (+)
	250	4011	Epididymis	-Yellow nodule (unilateral)	-Granuloma / spermalic (+)

* ; + : Mild